

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд,
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,
Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн
А/73, А/44, А/42 дугаар хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт

МОНГОЛ УЛСАД 2025 ОНД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙД УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН
ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ПЕСТИЦИДИЙН ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ

Нэг. 2025 онд хөдөө аж ахуйд ашиглаж болох пестицидийн жагсаалт

Д/д	Худалдааны нэр	Үйлчлэх бодисын нэр, хувь, хэмжээ	Томъёо	Олон улсын бүртгэлийн дугаар /CAS/	Зориулалт
ИНСЕКТИЦИД					
1	Децис	Дельтаметрин, 2.5%	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$	52918-63-5	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
2	Децимон	Дельтаметрин, 2.5%	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$	52918-63-5	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
3	Сумицидин	Фенвалерат, 20%	$C_{25}H_{22}ClNO_3$	51630-58-1	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
4	Сумипланта	Фенвалерат, 20%	$C_{25}H_{22}ClNO_3$	51630-58-1	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
5	Каратэ, МКС	Лямбда-цигалотрин, 5%	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	91465-08-6	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавж, хачигийн эсрэг 0.15-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
6	Каратэ, ЕС	Лямбда-цигалотрин, 5%	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	91465-08-6	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавж, хачигийн эсрэг 0.15-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
7	Каратокс	Лямбда-цигалотрин, 5%	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	91465-08-6	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавж, хачигийн эсрэг 0.15-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

8	Кинмикс, КЭ	Бета-циперметрин, 5%	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	65731-84-2	Бэлчээр, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
9	Кинтар	Бета-циперметрин, 5%	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	65731-84-2	Бэлчээр, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
10	Таран, ВЭ	Зэта-циперметрин, 10%	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	52315-07-8	Бэлчээр, ой, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.15-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
11	Тарацид	Зэта-циперметрин, 10%	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	52315-07-8	Бэлчээр, ой, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.15-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
12	Цунами, КЭ	Альфа-циперметрин, 100 г/л	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	67375-30-8	Агуулахын хөнөөлт шавж, хачигтай тэмцэх, үр тарианы хоосон агуулах, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, сав баглаа боодол, тээврийн хэрэгсэлд 0.2-0.8 мл/м2 зааврын дагуу хэрэглэнэ.
13	Фаскорд КЭ	Альфа-циперметрин, 100 г/л	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	67375-30-8	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.1-0.3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
14	Актеллик, КЭ	Пиримифос-метил, 500 г/л	$C_{11}H_{20}N_3O_3PS$	29232-93-7	Таваар, тэжээл, үрийн буудай, гурил, тэжээл, хүнсний үйлдвэрийн байр, тоног төхөөрөмж, үр тарианы агуулахад тархсан агуулахын шавж, хачигтай тэмцэх, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийхэд 16 мл/т, 0.4-0.8 мл/м2 тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
15	Хүхрийн утагч	Хүхэр, 750г/кг	S	7704-34-9	Хоосон хүлэмж, шилэн дарлага, төмс, жимс, ногооны зоорь, үрийн агуулахад шавж, хачиг, бактери, мөөгөнцрийн эсрэг 300 г/10м ³ орохоор тооцож ариутгалд хэрэглэнэ.
16	Фостоксин /утагч/	Хөнгөн цагааны фосфид, 560г/кг	AlP	20859-73-8	Агуулахын хөнөөлт шавьж, хачиг, мэрэгчтэй тэмцэх зорилгоор 10 мг/м2 тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
17	Актара, ВДГ	Тиаметоксам, 250г/кг	$C_8H_{10}ClN_5O_3S$	153719-23-4	Төмсний утсан өтний эсрэг хөрсөнд 0.3-0.6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
18	Биотлин, ВРК	Имидаклоприд, 200г/л	$C_9H_{10}ClN_5O_2$	138261-41-3	Хамгаалагдсан хөрсний лооль, хэмх, цэцэг чимэглэлийн ургамлын шавжийн эсрэг 15 мл/100м2 талбайд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
19	Залп, КЭ	Циперметрин, 250г/л	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	52315-07-8.	Буудай, чихрийн манжин, төмс, царгас, тоонолжин цэцэгт таримлын зарим

					шавьжийн эсрэг 0.2-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
20	Борей, СК	Имидаклоприд, 150 г/л	$C_9H_{10}ClN_5O_2$	138261-41-3	Бэлчээр, ой, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.1-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
21	Табу, ВСК	Имидаклоприд, 500 г/л	$C_9H_{10}ClN_5O_2$	138261-41-3	Буудай, арвай, төмс, рапс, чихрийн манжин, шар буурцагийн хөрсний болон зарим навч идэгч хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.4-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
22	Брейк, МЭ	Лямбда-цигалотрин, 100г/л	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	91465-08-6	Буудай, арвай, рапс, сонгино, байцаа болон бэлчээрийн ургамлын зарим шавж, шүлхий хачигийн эсрэг 0.07-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
23	Тиаклоприд	Тиаклоприд, 2%	$C_{10}H_9ClN_4S$	111988-49-9	Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
24	Тиаклоприд	Тиаклоприд, 0.5%	$C_{10}H_9ClN_4S$	111988-49-9	Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
25	Матрин	Матрин болон Osthole 1.3%	$C_{15}H_{24}N_2O$	519-02-8	Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
26	Имидамекс	Имидаклоприд, 700г/кг	$C_9H_{10}ClN_5O_2$	138261-41-3	Ургамал ургалтын хугацаанд буудай, хэмх, лооль, төмсний болон бусад ургамлыг сорох ба мэрэх амны эрхтэнтэй хортон шавжаас хамгаалахад 0.03-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
27	Фастак ЕС	Альфа-циперметрин 10%	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	67375-30-8	Бэлчээрийн хөнөөлт царцаа, төмс, хүнсний ногооны хортон шавьжийн эсрэг 0.15-0.25 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
28	Эмаектин бензоат	Эмаектин бензоат, 0.5%	$C_{56}H_{81}NO_{15}$	155569-91-8	Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг 0.12-0.25 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
29	К-Обоиль, КЭ	Дельтаметрин 2.5%	$C_{22}H_{19}Br_2NO_3$	52918-63-5	Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодол, тээврийн хэрэгсэл, гурил тэжээл, хүнсий үйлдвэрийн байр, агуулах, тоног төхөөрөмжийг агуулахын хөнөөлт шавжаас хамгаалах зорилгоор бүтээгдэхүүнд 5г/т агуулахад 0.6-0.8 мл/м ² тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
30	Самум, КЭ	Лямбда-цигалотрин, 50г/л	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	91465-08-6	Бэлчээрийн хөнөөлт царцаа, буудай, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний хортон

					шавьжийн эсрэг 0.15-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
31	Дакфосал, ТАБ	Хөнгөн цагааны фосфид 570г/кг	AlP	20859-73-8	Үр тарианы хоосон агуулахад 5м3 тунгаар, бүх төрлийн агуулахад хадгалагдаж байгаа үр, таваар, тэжээлийн зориулалттай будаанд тархсан шавж, хачигтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 9 г/т тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
32	Алиот, КЭ	Малатион, 570г/л	C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS ₂	121-75-5	Тоонолжин цэцэгтний эх ургамалд (байцаа, манжин) байцааны бөөсний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.
33	Престижитатор, КС	Имидаклоприд, 140 г/л +Пенцикурон, 150 г/л	C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂ ; C ₁₉ H ₂₁ ClN ₂ O	138261-41-3; 66063-05-6	Утсан өт, бөөс, энгийн ба хар цахлай өвчний эсрэг төмсний үрийг 0,7-1,0 кг/т тунгаар зааврын дагуу ариутгана.
34	Имидаклоприд 200 SL	Имидаклоприд, 200г/л	C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂ ;	138261-41-3	Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, чимэглэлийн ургамлын хортон шавж болон хамгаалагдсан хөрсний цагаан далавчтан, трипс, бөөсний эсрэг 0,25-0,3 л/га тунгаар хэрэглэнэ.
35	Эсперо, КС	Имидаклоприд, 200г/л+α-циперметрин 120г/л	C ₉ H ₁₀ ClN ₅ O ₂ ; C ₂₂ H ₁₉ Cl ₂ NO ₃	138261-41-3; 67375-30-8	Үр тариа, эрдэнэ шиш, рапсын хортон шавжийн эсрэг 0.1-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
36	Искра М, КЭ	Малатион, 525г/л	C ₁₀ H ₁₉ O ₆ PS ₂	121-75-5	Хайрсан далавчит хортон шавжтай тэмцэхэд 0.6-1.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
37	Искра двойной эффект	Циперметрин 21г/кг, +перметрин 9 г/кг	C ₂₂ H ₁₉ NO ₃ Cl ₂ ; C ₂₁ H ₂₀ Cl ₂ O ₃	52315-07-8; 52645-53-1	Таримал ургамлын хортон шавжийн эсрэг 10л усанд 1 шахмалыг хийж зааврын дагуу хэрэглэнэ.
38	Мухоед	Диазинон, 40г/кг	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	333-41-5	Талбайн хөрсөнд үүрлэгч бүх төрлийн шавж болон тэдгээрийн авгалдайтай тэмцэхэд 40-50 г/10 ам.метр талбайд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
39	Провотокс, Г	Диазинон, 40г/кг	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	333-41-5	Хүнсний ногооны талбайн утсан өттэй тэмцэхэд 40 г/10 ам.метр талбайд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
40	Террадокс	Диазинон, 40г/кг	C ₁₂ H ₂₁ N ₂ O ₃ PS	333-41-5	Хүнсний ногооны талбайд хөрсний хортон шавжтай тэмцэхэд 40 г/10 ам.метр талбайд зааврын дагуу хэрэглэнэ.

41	Сэмпей КЭ	Эсфенвалерат, 50г/л	$C_{13}H_{14}F_3N_3O$	66230-04-4	Мэрэх болон сорох амны эрхтэнтэй хортон шавжуудад хүрэлцэх болон хоол боловсруулах замаар богино хугацаанд дайжуулах, хордуулах, үхүүлэх үйлчилгээтэй ба 0.2-0.3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
42	Сирроко, КЭ	Диметоат, 400г/л	$C_5H_{12}NO_3PS_2$	60-51-5	Төмс, хүнсний ногооны талбайд сонгины ялаа, цацаг далавчит, хивэн эрвээхэй зэрэг хортонтой тэмцэхэд 0.1-0.16 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
43	Шарпей, МКЭ	Циперметрин, 250г/л	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	52315-07-8	Төмс, хүнсний ногоо, тосны ургамлын талбайд цох, ургамлын бясaa, нөмрөг зэрэг хортонтой тэмцэхэд тосны ургамалд 0.1-0.2 л/га, төмс, хүнсний ногоонд 0.1-0.16 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
44	Тиовет Джет	Хүхэр ВДГ, 800 г/кг	S	7704-34-9	Таримлын гуалах өвчин болон шүлхий хачгийн эсрэг 0.8%-ийн уусмалаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
45	Темро, SC	Бета-цифлутрин, 11,8%	$C_{22}H_{18}CL_2FNO_3$	68359-37-5	Хүнсний үйлдвэрийн байр, барилга байгууламжийн гадна болон дотор талбай дахь агуулахын болон ахуйн хортон шавжтай тэмцэх, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, ариутгах
46	Тиара, КС	Тиаметоксам, 350г/л	$C_8H_{10}ClN_5O_3S$	153719-23-4	Буудай, арвайн үрийг үет ургамлын ялаа, нөмрөг, бүүргэний эсрэг 0,5-1л/т тунгаар ариутгах ба ургалтын хугацаанд нөмрөгт бясaаны эсрэг 0,04-0,061 л/га тунгаар хэрэглэнэ.
47	Герольд	Дифлубензурон, 240 г/л	$C_{14}H_9ClF_2N_2O_2$	35367-38-5	Байцааны хивэн, бүгэг, алимны үрч эрвээхий ба бусад хайрсан далавчтан, бэлчээр, нуга, ойн хөнөөлт шавьж, царцаатай тэмцэхэд 0,1-1,0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
48	Тебүфенозид 240 SC, Мимик 240 SC	Тебүфенозид, 240 г/л	$C_{22}H_{28}N_2O_2$	112410-23-8	Өрөөсгөл хүр, Сибирийн хүр зэрэг ой, модлог ургамал,

49	Циприн	Циперметрин, 98% бодист цис 20%, транс 80%	$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$	52315-07-8	Ойн шилмүүст модны хөнөөлт шавжийн эсрэг 50-100 мл/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
50	Молния, КЭ	Лямбдацигалотрин, 5%	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	91465-08-6	Бэлчээр, ой, таримлын болон агуулахын хөнөөлт шавж, хачгийн эсрэг 0.15-0.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
51	Командор ВРК	Имидаклоприд, 200 г/л	$C_9H_{10}ClN_5O_2$;	138261-41-3	Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, чимэглэлийн болон хамгаалагдсан хөрсний цагаан далавчтан, трипс, бөөсний эсрэг 0.25-0.3 л/га тунгаар хэрэглэнэ.
52	Локустин, КС	Дифлубензурон-125 г/л+ Имидаклоприд, 110 г/л	$C_{14}H_9ClF_2N_2O_2$ $C_9H_{10}ClN_5O_2$;	35367-38-5 138261-41-3	Бэлчээр, буудайн талбайн хөнөөлт царцааны эсрэг 0.08-0.12 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
53	Восторг КС	Клотианидин 40-50% +Ламбдацигалотрин	$C_6H_8ClN_5O_2S$ + $C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$	210880-92-5 91465-08-6	Үр тариа тосны ургамлын хортон шавьжийн эсрэг 0.1-0.15 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
54	Калаш, ВРК	Имидаклоприд, 200 г/л	$C_9H_{10}ClN_5O_2$;	138261-41-3	Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, чимэглэлийн ургамлын хортон шавж болон хамгаалагдсан хөрсний цагаан далавчтан, трипс, ургамлын бөөс, цикадны эсрэг ургалтын үед 0,15-0,75 л/га тунгаар хэрэглэнэ.
55	Стрит, КС	Имидаклоприд, 600 г/л	$C_9H_{10}ClN_5O_2$;	138261-41-3	Үр тарианы ургамлыг үрийн соёололтын үеийн болон нахиалалтын үеийн хөрсөн доторх хортон шавжаас хамгаалах үр ариутгалын зориулалттай, системийн үйлчилгээтэй, ургамлын өсөлтийг зохицуулах үйлчилгээтэй инсектицид. Хэрэглэх тун: 0,3-0,6 л/т
56	Харита, КС	Тиаметоксам, 600г/л	$C_8H_{10}ClN_5O_3S$	153719-23-4	Үр тарианы ургамлыг үрийн соёололтын үеийн болон нахиалалтын үеийн хөрсөн доорх хортон шавьжаас хамгаалах үр ариутгалын зориулалттай системийн үйлчилгээтэй, ургамлын өсөлтийг зохицуулагч инсектицид. Үр тарианы ургамалд 0,3-0,6 л/тонн

57	Табу супер, КС	Имидаклоприд (400г/л) + фипронил (100г/л)	$C_9H_{10}ClN_5O_2 +$ $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$	138261-41; 120068-37-3	Үрийн төмс болон суулгац материалыг урт хугацаанд хөрсөнд үүрлэгч хортон шавжаас хамгаалах тарихын өмнө ариутгах зориулалттай, системийн үйлчилгээтэй, ургамлын өсөлтийг зохицуулагч давхар үйлчилгээтэй инсектицид. Хэрэглэх тун: үр тарианд 1-1,5 л/т, төмс, хүнсний ногоонд 0,4-0,6 л/т
58	Асифлон	Acetamiprid 15% + Flonicamid 20% WG	$C_{10}H_{11}ClN_4$; $C_9H_6F_3N_3O$	135410-20-7; 158062-67-0	Буудай, арвай, наранцэцэг, шар буурцаг, рапс, хэмх зэрэг таримлын олон төрлийн шавжийн эсрэг 90 – 150 гр/га тунгаар шүршинэ.
59	Молния дуо	лямбда-цигалотрин-106 г/л тиаметоксама- 141 г/л	$C_{23}H_{19}ClF_3NO_3$ $C_8H_{10}ClN_5O_3S$	91465-08-6 153719-23-4	Буудай, арвай, байцаа, вандуй, шар буурцаг, рапс, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, лоолийн хортон шавжийн эсрэг 0.1-0.4л/га тунгаар шүршинэ.
ГЕРБИЦИД					
60	Лорнет, ВР	Клопиралид, 300г/л	$C_6H_3Cl_2NO_2$	1702-17-6	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг, чихрийн манжин, олс, гүзээлзгэнэ, зусах болон өвөлжих рапсын талбайд, буудайн бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.16-0.66л/га, чихрийн манжингийн 3 жинхэнэ навчтай үед 0.3-0.5л/га, рапсын 3-4 жинхэнэ навчтай үед 0.3-0.4л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
61	Зингер, СП	Метсульфурон метил, 600г/кг	$C_{14}H_{15}N_5O_6S$	74223-64-6	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 8-10 г/га тунгаар бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
62	Алмазис, ВДГ	Метсульфурон метил, 600г/кг	$C_{14}H_{15}N_5O_6S$	74223-64-6	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 8-10 г/га тунгаар бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
63	Магнум, ВДГ	Метсульфурон метил, 600г/кг	$C_{14}H_{15}N_5O_6S$	74223-64-6	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 8-10 г/га тунгаар тооцож зааврын дагуу хэрэглэнэ.
64	Фенизан, ВР	Дикамба 360г/л+хлорсульфурон 22.2 г/л	$C_8H_6Cl_2O_3$ $C_{12}H_{12}ClN_5O_4S$	1918-00-9; 64902-72-3	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.14-0.2 л/га тунгаар

					бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
65	Спрут экстра, ВР	Глифосат, 540 г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 2-3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
66	Раундап, ВР	Глифосат, 410 г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 2-3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
67	Раундап, ВР	Глифосат, 480 г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 2-3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
68	Пумасупер, ЭМВ	Феноксапроп-П -этил, 75 г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$	71283-80-2	Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.8-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
69	Овсюген Экспресс, КЭ	Феноксапроп-П-этил, 140г/л +Клоквинтосет-мексил, 35г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5+$ $C_{18}H_{22}ClNO_3$	71283-80-2; 99607-70-2	Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.4-0.6 л/га тунгаар бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
70	Гезагард, КС	Прометрин, 50%	$C_{10}H_{19}N_5S$	7287-19-6	Төмс, луувангийн талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 2-3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
71	Зонтран, ККР	Метрибузин, 250г/л	$C_8H_{14}N_4OS$	21087-64-9	Төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг 1.0-1.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
72	Реглон, ВР	Дикват, 20%	$C_{12}H_{12}Br_2N_2$	85-00-7	Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 2-3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
73	Рапсан, ВР	Клопиралид, 267г/л +пиклорам	$C_6H_3Cl_2NO_2 +$ $C_6H_3Cl_3N_2O_2$	1702-17-6; 1918-02-1	Зусах өвөлжих рапсын нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.3-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
74	Кассиус, ВРП	Римсульфурон, 250г/кг	$C_{14}H_{17}N_5O_7S_2$	122931-48-0	Төмсний талбайн хог ургамлын эсрэг 50-70 л/га тунгаар таримлыг соёолохоос өмнө болон төмсний бут 10-15 см өндөр болсон үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
75	Форвард, МКЭ	Хизалофоп-П-этил 60г/л	$C_{19}H_{17}ClN_2O_4$	100646-51-3	Чихрийн манжин, шар манжин, зусах ба өвөлжих рапс, шар буурцаг, наранцэцэгийн талбайн үет нэг болон олон наст хог ургамлын эсрэг га-д 0.9-1.2 л/га тунгаар 1 наст хог ургамлын 2-4 навчтай, олон наст

					мөлхөө хиагны өндөр 10-15 см болсон үед зааврын дагуу хэрэглэнэ
76	Дротик, ККР	2.4-D этилгексилийн эфир, 400г/л	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	1928-43-4	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.7-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
77	Эстамп, КЭ	Пендиметалин, 330 г/л	$C_{13}H_{19}N_3O_4$	40487-42-1	Төл болон хар үрээр тариалсан сонгины талбайд таримал ургамал цухуйхаас өмнө нэг наст үетэн зарим төрлийн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 2.3-4.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
78	Фурэкс, КЭ	Феноксапроп-П-этил, 90г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$	71283-80-2	Чихрийн манжин, тэжээлийн манжин, хүрэн манжин, бөөрөнхий байцаа, шар лууван, шар буурцаг, олс, рапс, вандуй, наранцэцэгийн талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.6-0.9 л/га тунгаар хог ургамлын 2 навчтайгаас бутлалтын төгсгөл хүртэл хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
79	Гоал 2Е, КЭ	Оксифлуорфен, 240г/л	$C_{15}H_{11}ClF_3NO_4$	42874-03-3	Бөөрөнхий болон хар үрийн сонгино, сармисны талбайд тарьсанаас 2-3 навчтай болсон үед нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.5-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
80	Миура, КЭ	Хизалофоп-П-этил, 125г/л	$C_{19}H_{17}ClN_2O_4$	100646-51-3	Чихрийн болон тэжээлийн манжин, шар лууван, бөөрөнхий байцаа, шар буурцаг, сонгины / хөгжлийн бүхий л үе шатанд /, наранцэцэг, рапс, төмсний талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.4-0.8 л/га, олон наст / мөлхөө хиаг/ хог ургамлын эсрэг 0.8-1.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
81	Балерина, СЭ	2.4-Д (2-этилгексилийн эфир), 410г/л + флорасулам, 7.4 г/л	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$; + $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	1928-43-4; 145701-23-1	Үр тарианы талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.3-0.5 л/гатунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
82	Торнадо 500, ВР	Глифосат, 500г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 1.5-5.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

83	Зенкор, СП	Метрибузин, 70%	$C_8H_{14}N_4OS$	21087-64-9	Лооль, төмсний талбайн нэг наст хос үрийн талт, зарим төрлийн үет хог ургамлын эсрэг 0.7-1.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
84	Галион, ВР	Клопиралид, 300г/л +пиклорам, 75г/л	$C_6H_3Cl_2NO_2$; $C_6H_3Cl_3N_2O_2$	1702-17-6; 1918-02-1	Зусах, өвөлжих рапс тариалсан талбайд хог ургамлын 3-6 жинхэнэ навчтай үед 0.27-0.31 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
85	Лазурит, СП	Метрибузин, 700г/кг	$C_8H_{14}N_4OS$	21087-64-9	Төмс, лооль, шар буурцаг, эрдэнэ шишийн талбайн хог ургамлын эсрэг 1.1-1.4 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
86	Ластик экстра, КЭ	Феноксапроп-П-этил, 70г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$	71283-80-2;	Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.8-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
87	Плуггер, ВДГ	Трибенурон-метил, 625г/кг+ метсульфурон метил	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$ $C_{14}H_{15}N_5O_6S$	101200-48-0 74223-64-6	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 15-20 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
88	Хакер, ВРГ	Клопиралид 750г/кг	$C_6H_3Cl_2NO_2$	1702-17-6	Чихрийн болон тэжээлийн манжин, зусах рапс, бөөрөнхий байцааны хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 120-200 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
89	Пурестар	Глифосат, 24 г/л +сафлуфенацил	$C_3H_8NO_5P$; $C_3H_9C_3H_9$;	1071-83-6 338641-94-0;	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 1.0-3.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
90	Нурон, ВДГ	Трибенурон метил, 75%	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Үр тарианы талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 20-25 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
91	Эскудо, ВДГ	Римсульфурон, 500г/л	$C_{14}H_{17}N_5O_7S_2$	122931-48-0	Эрдэнэ шиш, лооль, төмсний талбайн бүх төрлийн үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 15-25 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
92	Ластик Топ, МКЭ	Феноксапроп-П-этил, 90г/л + клодинафоп-пропаргил, 60г/л +клоквинтосет-мексил, 40г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$ $C_{17}H_{13}ClFNO_4$ $C_{18}H_{22}ClNO_3$	71283-80-2; 105512-06-9; 99607-70-2	Арвай, зусах болон өвөлжих буудайн талбайн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0.4-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
93	Адью	Этоксилат изодецилийн спирт, 900г/л	$C_{10}H_{21}OH$	25339-17-7	Гербицидтэй хольж үр нөлөөг дээшлүүлж идэвхжүүлэх зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
94	Тримекс, ВДГ	Трибенурон-метил, 750 г/кг	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Үр тарианы талбай хос үрийн талт хог ургамалтай тэмцэхэд өндөр үр дүнтэй

					соёололтын дараа 15-25 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
95	Клиомекс, ВРК	Клопиралид, 300 г/л	$C_6H_3Cl_2NO_2$	1702-17-6	Буудайн бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.2–0.6 л/га тунгаар, зусах рапсын 3-4 навчтай үед 0.4-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
96	Клодимекс Плюс	Феноксапроп-П-этил, 90 г/л + Клодинафоп-пропаргил, 45 г/л + Клоквинтосет –мексил, 34,5 г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$ $C_{17}H_{13}ClFNO_4$ $C_{18}H_{22}ClNO_3$	71283-80-2; 105512-06-9; 99607-70-2	Буудайн талбайн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг соёололтын дараа 0.4-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
97	Агронекс Про	Диоктил сульфосукцинат натри+метоксипропок сипропанил	$C_{20}H_{37}NaO_7S$	577-11-7;	Буудай, эрдэнэ шиш, арвай, чихрийн манжин зэрэг таримлын талбайд гербицид хэрэглэхэд үйлчилгээг нь сайжруулах зорилгоор 150-200 мл/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
98	Базагран, ВР	Бентазон, 480г/л	$C_{10}H_{12}N_2O_3S$	25057-89-0	Буудай, арвай, хөх тариа, вандуй зэрэг таримлын хос үрийн талт хог ургамалд 2-4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
99	Нопасаран, КС	Метазахлор, 375г/л, +имазомакс	$C_{14}H_{16}ClN_3O$ $C_{15}H_{19}N_3O_4$	67129-08-2; 114311-32-9	Зусах рапсын 2-6 навчтай үед үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.8-1.2 л/га тунгаар зааврын хэрэглэнэ.
100	Гербитокс, ВРК	МЦПА (диметил амины давс + калийн давс +натрийн давсны холимог), 500 г/л	$C_9H_9ClO_3$	94-74-6	Буудай, арвай, хошуу будаа, вандуйн талбайн нэг наст хос үрийн талт хог ургамалтай 0.7-1.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
101	Деметра, КЭ	Флуорокспир, 350 г/л	$C_7H_5Cl_2FN_2O_3$	69377-81-7	Буудай, арвайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.43-0.57 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
102	Дублон голд, ВДГ	Никосульфурон, 600г/кг + тифенсульфурон-метил, 150г/кг	$C_{15}H_{18}N_6O_6S$; $C_{12}H_{13}N_5O_6S_2$	111991-09-4; 79277-27-3	Эрдэнэшишийн талбайн бүх төрлийн үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 50-70 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
103	Квикстеп, МКЭ	Клетодим, 130г/л + галоксифоп-Р-метил, 80г/л	$C_{17}H_{26}ClNO_3S$; $C_{16}H_{13}F_3ClNO_4$	99129-21-2; 72619-32-0	Зусах рапс, чихрийн манжин, шар буурцагын талбайн нэг ба олон наст үет хог ургамлын эсрэг 0.4-0.8 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
104	Суховей, ВР	Дикват, 150г/л	$C_{12}H_{12}Br_2N_2$	2764-72-9	Төмс, наранцэцгийг хатаах, үр тарианы талбайн үет болон хос үрийн талт хог ургамлын үрийн боловсролтыг

					хурдасгах зорилгоор 1.5-2.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
105	Гайтан, КЭ	Пендиметалин, 330 г/л	$C_{13}H_{19}N_3O_4$	40487-42-1	Сонгино талбайд 2.3-4.5 л/га, луувангийн талбайд 3-6 л/га тунгаар нэг наст үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг таримал соёолохоос өмнө зааврын дагуу хэрэглэнэ.
106	Гамбит, СК	Прометрин, 500 г/л	$C_{10}H_{19}N_5S$	7287-19-6	Луувангийн талбайд 1.5-3 л/га тунгаар таримал соёолохоос өмнө ба соёолсоны дараа 1-2 навчтай үед, төмсний талбайд 2-3.5 л/га тунгаар соёолохоос өмнө зааврын дагуу хэрэглэнэ.
107	Глибест гранд, ВДГ	Глифосат, 687 г/кг	$C_6H_{17}N_2O_5 P$	38641-94-0	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 0.3-4.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
108	Допинг, КЭ	Клодинафоп-пропаргил, 80г/л + Клоквинтосет-мексил, 20 г/л	$C_{17}H_{13}ClFNO_4$; $C_{18}H_{22}ClNO_3$	105512-06-9; 99607-70-2	Зусах ба өвөлжих буудайн талбайн хонгио хошуу будаа, ногоон хоног будаа болон бусад нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар таримлын бутлалтаас гол хатгалтын үе шатанд хог ургамлын 2-3 навчтай үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
109	ДФЗ супер, ВРГ	Дикамба, 359 г/л +метсульфурон метил 27 г/л	$C_8H_6Cl_2O_3$; $C_{14}H_{15}N_5O_6S$	1918-00-9;	Үр тарианы талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.12-0.15 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
110	Суперстар, ВДГ	Трибенурон-метил, 750г/л	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Таримлын 2-3 навч гарсан буюу бутлалтын үед 15-25 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
111	Контакт, ВДГ	Метрибузин, 700 г/кг	$C_8H_{14}N_4OS$	21087-64-9	Таримлыг цухуйхаас өмнө буюу төмсний бут 5 см өндөр үед 0.5-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
112	Метримекс, ВДГ	Метрибузин, 700г/кг	$C_8H_{14}N_4OS$	21087-64-9	Таримлыг цухуйхаас өмнө буюу төмсний бут 5 см өндөр үед 0.5-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
113	Клитомекс, ВРК	Клетодим, 240г/л	$C_{17}H_{26}ClNO_3S$	99129-21-2	Төмс, шар лууван, сонгины талбайн үет нэг болон олон наст хог ургамлын эсрэг 0.2-1.0 л/га тунгаар нэг наст хог ургамлын 2-6 навчтай, мөлхөө хиагны өндөр 10-15 см болсон үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.

114	Глиомекс, ВР	Глифосат, 540 г/л	$C_3H_7KNO_5P$	39600-42-5	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 0.3-4.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
115	Бицепс 22, КЭ	Десмедифам, 100 г/л +фенмедифам 100 г/л	$C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{16}H_{16}N_2O_4$	13684-56-4; 13684-56-5;	Чихрийн манжин, хүрэн манжин, тэжээлийн манжингийн талбайн нэг наст хос үрийн талт зарим төрлийн үет хог ургамлын эсрэг хослосон үйлчилгээтэй таримлыг 4 жинхэнэ навчтай үед 3 л/га тунгаар соёололтын дараа зааврын дагуу хэрэглэнэ.
116	Симба, КЭ	С-Метолахлор, 960г/л	$C_{15}H_{22}ClNO_2$	87392-12-9	Чихрийн манжин, наран цэцэг, эрдэнэ шиш, шар буурцаг, рапс, бөөрөнхий байцааны талбайн нэг наст үет болон зарим төрлийн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 1.3-2.0 л/га тунгаар таримлыг соёолохоос өмнө зааврын дагуу хэрэглэнэ.
117	Гаур, КЭ	Оксифлуорфен, 240г/л	$C_{15}H_{11}ClF_3NO_4$	42874-03-3	Сонгино /хөгжлийн бүх үе шатанд/ сармис, наранцэцэгийн талбайн нэг наст хос үрийн талт зарим төрлийн үет хог ургамлын эсрэг 0.5-1.0 л/га тунгаар таримлын 2-3 навчтай үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
118	Парадокс, ВРК	Имазамокс, 120г/л	$C_{15}H_{19}N_3O_4$	114311-32-9	Шар буурцаг, вандуй, наранцэцэг, рапсын талбайн нэг наст, зарим төрлийн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.25-0.4 л/га тунгаар таримлын 4-5 жинхэнэ навчтай үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
119	Магнум супер, ВДГ	Трибенурон-метил, 450г/кг +метсульфурон метил 300г/кг	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$, $C_{14}H_{15}N_5O_6S$	101200-48-0;	Буудай, арвай, хошуу будааны талбайн хос үрийн талт нэг болон олон наст хог ургамлын эсрэг 9-12 г/га тунгаар таримлын бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
120	Гезадар, КС	Прометрин, 500 г/л	$C_{10}H_{19}N_5S$	7287-19-6	Луувангийн талбайд 1.5-3 л/га тунгаар таримал соёолохоос өмнө ба соёолсоны дараа 1-2 навчтай үед, төмсний талбайд 2-3.5 л/га тунгаар соёолохоос өмнө зааврын дагуу хэрэглэнэ.
121	Бицепс гарант, КЭ	Десмедифам, 70 г/л +фенмедифам, 90г/л +этофумеза, 110 г/л	$C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{13}H_{18}O_5S$	13684-56-4; 13684-56-5; 26225-79-6	Чихрийн манжин, хүрэн манжин, тэжээлийн манжингийн талбайн нэг наст хос үрийн талт зарим төрлийн үет хог ургамлын эсрэг хослосон үйлчилгээтэй таримлыг 4 жинхэнэ

					навчтай үед 3 л/га тунгаар соёололтын дараа зааврын дагуу хэрэглэнэ.
122	Пилот, ВСК	Метамитрон, 700г/л	$C_{10}H_{10}N_4O$	41394-05-2	Чихрийн манжин, хүрэн манжин хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 1.5-2.0 л/га тунгаар таримлыг соёолохоос өмнө болон соёолсоны дараа зааврын дагуу хэрэглэнэ.
123	Торнадо 540, ВР	Глифосат хүчлийн калийн давс, 540г/л	$C_3H_8NO_5P$	39600-42-5;	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 1.4-3.7 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
124	Грейдер, ВГР	Имазапир, 250г/л	$C_{13}H_{15}N_3O_3$	81334-34-1	Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалтын бүс, хийн болон газрын тос дамжуулах хоолой, төмөр зам, хурдны замын далан, нисэх онгоц, бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай зам харгуйд 2-5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
125	Топ-120	Клетодим (120г/л)	$C_{17}H_{26}ClNO_3S$	99129-21-2	Төмсний талбайн нэг ба олон наст үет хог ургамлын эсрэг 0,75-1,5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ. Шар манжингийн талбайн үет нэг наст хог ургамлуудыг 2-8 навчтай үед, олон наст үет хог ургамлыг 4-8 навчтай үед 0.7-1.5 л/га тунгаар шүршиж хэрэглэнэ.
126	Сульфосат	Сульфометурон-метил, 2.5% +глифосат 72%, NH_4 , 80%	$C_{15}H_{16}N_4O_5S$; $C_3H_8NO_5P$	74222-97-2;	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 1,0-1,6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
127	Бензолон ЕС	Quizalofop-p-ethyl 2.5%; Benazolin-15%	$C_{19}H_{17}ClN_2O_4$; $C_9H_6ClNO_3S$	100646-51-3;	Рапсын нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.26-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
128	Мортира, ВДГ	Трибенурон-метил, 750 г/кг	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Буудай, зусах арвай, хошуу будаанд нэг наст хос үрийн талт, ялангуяа 2.4Д-д тэсвэртэй хог ургамлын эсрэг таримлын 2 навчтайгаас бутлалт эхлэх үед, хог ургамлын (2-4) навчтай үед га-д 15-20 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
129	Плоуре	Fluoroglyphen-ethyl 10% ЕС	$C_{18}H_{13}ClF_3NO_7$	77501-90-7	Буудай, арвай, хошуу будаа, шар буурцгийн талбайд нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 60-75 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

130	Фабиан, ВДГ	Имазетапир, 450 г/кг+хлоримурон-этил, 150г/кг	$C_{15}H_{19}N_3O_3$; $C_{15}H_{15}ClN_4O_6S$	81335-77-5; 90982-32-4	Шар буурцгийн таримлын талбайн нэг наст, зарим олон наст хос үрийн талт, нэг наст үет хог ургамлын эсрэг хэрэглэх хосолмол, сонгомол үйлчилгээтэй ба хог ургамлыг нялх (үет хог ургамлын 2-3 навчтай, хос үрийн талт хог ургамлын 4-6 навчтай үе хүртэл) үед таримлын хөгжлийн үе шатаас хамааралгүйгээр га-д 80-100 г/га зааврын дагуу хэрэглэнэ.
131	Корсар, ВРК	Бентазон, 480 г/л	$C_{10}H_{12}N_2O_3S$	25057-89-0	Буурцагт таримлын хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг шар буурцгийн 1 жинхэнэ навч үүсэх үед, хог ургамлын (2-6 навчтай) нялх үед 1.5-3.0 л/га, вандуйнд таримлын 5-6 навчтай, хог ургамлын нялх үед 2-3 л/га тунгаар тус тус зааврын дагуу хэрэглэнэ.
132	Балерина супер, СЭ	2.4Д, 410г/л; +флорасулам	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$; $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	1928-43-4; 145701-23-1	Буудай, арвай, тритикал, хөх тариа, хошуу будааны талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
133	Зерномакс, КЭ	2.4Д, 500г/л; +трибенурон метил	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$; $C_{15}H_{17}N_5O_6S$	1928-43-4; 101200-48-0	Буудай, арвайн талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.6-0.8 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
134	Фенсок, EW	Феноксапроп-П-этил, 69г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$	113158-40-0	Буудай, арвай талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.75-0.9 л/га тунгаар хог ургамлын 2 навчтайгаас бутлалтын төгсгөл хүртэл хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
135	Карба, OD	Флукарбазон, 6.5% + клодинафоп-пропаргил, 6.5%	$C_{12}H_{11}F_3N_4O_6S$; $C_{17}H_{13}ClFNO_4$;	181274-17-9; 105512-06-9;	Буудайн талбайн нэг наст үет, зарим хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.4-0.6 л/га тунгаар таримлын бутлалтаас гол хатгалтын үе шатанд хог ургамлын 2-3 навчтай үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
136	Флора, WP	МСПА, 40.8%+ флорасулам 1.29	$C_9H_9ClO_3$; $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	94-74-6; 145701-23-1	Буудайн талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.65-0.95 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
137	Хиза, ЕС	Хизалофоп-П-метил, 108г/л	$C_{16}H_{13}ClF_3NO_4$	69806-40-2	Рапс, шар буурцаг, сонгино, төмсний талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг

					0.45-0.6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
138	Күиза, ЕС	Күизалофоп-П-этил, 8.8%	$C_{19}H_{17}ClN_2O_4$	128711	Рапс, шар буурцаг, төмсний талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.45-0.75 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
139	Феноксапрон-П-этил	Феноксапрон-П-этил, 140г/л +Антидот, 35г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$	113158-40-0	Буудайн бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.4-0.6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ. Антидотыг гербицидтэй хольж үр нөлөөг дээшлүүлж идэвхжүүлэх зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
140	Глифосат	Глифосат, 500г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг га-д 1.5-3.5 л/га тунгаар 200-300 л ажлын шингэн орохоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
141	Глифосат	Глифосат, 540г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг га-д 1.5-3.5 л/га тунгаар 200-300 л ажлын шингэн орохоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
142	Хизалофоп-П-этил	Хизалофоп-П-этил, 125г/л	$C_{19}H_{17}ClN_2O_4$	100646-51-3	Рапсын талбайн үет нэг болон олон наст хог ургамлын эсрэг га-д 0.6-0,8 л/га тунгаар 1 наст хог ургамлын 2-4 навчтай, олон наст мөлхөө хиагны өндөр 10-15 см болсон үед зааврын дагуу хэрэглэнэ
143	2.4 Д бутилийн эфир	2.4 Д бутилын эфир, 720г/л	$C_{12}H_{14}Cl_2O_4$	94-80-4	Буудайн талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 60-70 г/га тунгаар бутлалтаас гол хатгалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
144	Горгон, ВРК	МЦПА кислота, 350 г/л, +пиклорам, 150 г/л.	$C_9H_9ClO_3$; $C_6H_3Cl_3N_2O_2$	94-74-6; 1918-02-1	Буудай, арвай талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хөнөөлт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.15-0.17 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
145	Аллор, Ш	Тосны амины этоксилат, хьюмектант, хүчиллэг тохируулагч	$C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$	25956-17-6	Гербицидтэй хольж үр нөлөөг дээшлүүлж идэвхжүүлэх зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ
146	Бриг, КС	Прометрин, 500г/л	$C_{10}H_{19}N_5S$	7287-19-6	Луувангийн талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг соёолохоос өмнө 1.5-2.0л/га, соёолсоны дараа 1-2 навчтай үед 2-3 л/га

					тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ
147	Гезадар	Прометрин, 500г/л	$C_{10}H_{19}N_5S$	7287-19-6	Луувангийн талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг соёолохоос өмнө 1.5-2.0 л/га, соёолсоны дараа 1-2 навчтай үед 2-3 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
148	Пума 7.5	Феноксапроп-П-этил, 75г/л + антидот, 21 г/л	$C_{16}H_{12}ClNO_5$	71283-80-2	Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.8-1.0 л/га тунгаар 200-300 л ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
149	Глифосат	Глифосат, 480г/л	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг га-д 2,0-3,0 л тунгаар 200-300 л ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
150	Глифосат, WDG	Глифосат, 75.7%	$C_3H_8NO_5P$	1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг га-д 2,0-2,5 кг тунгаар 200-300 л ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
151	Гранат, ВДГ	Трибенурон метил, 750г/кг	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Буудайн талбайн нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 15-20 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
152	Примадонна, СЭ	2.4Д (2этилгексиль эфир), 200г/л + флорасулам, 3.7г/л	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$; $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	1928-43-4; 145701-23-1	Буудай талбайн нэг болон олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг бутлалтаас гол хатгалтын үед 0.6-0.9 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
153	Дикват, ВР	Дикват, 150г/л	$C_{12}H_{12}Br_2N_2$	2764-72-9	Үр тариа, төмс, сонгино, наранцэцгийн чийгийг бууруулах, хатаах, үр боловсролтыг хурдасгах, талбайн үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 1.5-2.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
154	Фузилад макс	Флуазифоп-П-бутил, 125г/л	$C_{19}H_{20}F_3NO_4$	79241-46-6	Бөөрөнхий сонгино, саримсны талбайн үет, нэг ба олон наст хог ургамлын эсрэг 1.5-2.0 л/га тунгаар ургац хураахаас 28 хоногийн өмнө зааврын дагуу хэрэглэнэ.
155	Стомп 400	Пендиметалин, 400 г/л	$C_{13}H_{19}N_3O_4$	40487-42-1	Бөөрөнхий сонгино, саримсны талбайд таримал ургамал цухуйхаас өмнө нэг наст

					үетэн зарим төрлийн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 2.3-3.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
156	Starane top	fluroхуруу-meptyl (ISO) 480 г/л	$C_{15}H_{21}Cl_2FN_2O_3$	81406-37-3	Бөөрөнхий сонгино, саримсны талбайн хос үрийн талт нэг ба олон наст хог ургамлын эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
157	AZ 500	Изоксабен 500 г / л	$C_{18}H_{24}N_2O_4$	82558-50-7	Бөөрөнхий сонгино, саримсны талбайн хос үрийн талт нэг ба олон наст хог ургамлын эсрэг 0.15-0.3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
158	Глифосат- Дикамба	Дикамба 10.5 + Глифосат 59.5%	$C_8H_6Cl_2O_3$ $C_3H_8NO_5P$	1918-00-9, 1071-83-6	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг га-д 0.9-1.2 кг тунгаар 200-300 л ажлын шингэн орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
159	Брис ВДГ	750 г/кг клопиралид	$C_6H_3Cl_2NO_2$	58509-83-4	Үр тариа, рапсын хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.12 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
160	Граунд, ВР	540 г/л глифосат кислот	$C_3H_8NO_5P$	38641-94-0	Уринш, төмс, жимс, жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 0.3-4.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
161	Дива КС	550 г/л 2,4Д + 7,4г/л флорасулм	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$; $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	1928-43-4; 145701-23-1	Буудай, арвай, эрдэнэшишийн нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0.3-0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
162	Орион КЭ	104 г/л галоксифоп-п-метио	$C_{16}H_{13}ClF_3NO_4$	72619-32-0	Манжин, рапс, шар буурцаг, наранцэцгийн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0.5-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
163	Трибинистр ВДГ	750 г/кг трибенурон – метил	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Үр тарианы нэг наст хос үрийн талт ургамлын эсрэг 15-20 г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
164	Феноксоп 100, КЭ	Феноксапрон-П-этил +клоквинтосет мексил	$C_{18}H_{16}ClNO_5$ $C_{18}H_{22}ClNO_3$	71283-80-2; 99607-70-2	Буудай, арвайн талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.4-0.9 л/га хэрэглэнэ.
165	Тайгер 100, КЭ	Феноксапрон-П-этил+Антидот клоквинтосет- мексил, (100 г/л + 27 г/л)	$C_{18}H_{16}ClNO_5$ $C_{18}H_{22}ClNO_3$	71283-80-2; 99607-70-2	Үр тарианы талбайн үет нэг наст хог ургамлын эсрэг 0.4-0.9 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
166	Бетарен Экспресс,	60г/л Десмедифам+ 60 г/л фенмедифам+ 60 г/л этофумезат	$C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{13}H_{18}O_5S$	13684-56-4; 13684-56-5; 26225-79-6	Чихрийн манжингийн талбайн нэг наст хос үрийн талт болон зарим төрлийн үет хог ургамлын эсрэг 4 л/га тунгаар таримлын 2-4

					жинхэнэ навчтай үед, хог ургамлын үрийн талын навч гарч эхлэх үед 2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
167	Бетарен супер МД, МКЭ	126г/л Этофумезат + 63 г/л фенмедифам+21 г/л десмедифам	$C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{16}H_{16}N_2O_4$; $C_{13}H_{18}O_5S$	13684-56-4; 13684-56-5; 26225-79-6	Чихрийн манжин, тэжээлийн манжингийн талбайн нэг наст хос үрийн талт, зарим төрлийн үет нэг наст хог ургамалтай таримлын 4 жинхэнэ навчтай үед 2.7-3.6 л/га, хог ургамлын 2-4 навчтай үед 1.36-1.8 л/га, тарилтаас хог ургамлын үрийн талын навч цухуйх үед 0.9-1.2 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
168	Балерина Форте, СЭ	Нийлмэл 2-этилгексилийн эфир 2,4-Д, 300 г/л+ пиклорам, 37,5 г/л + флорасулам, 10 г/л	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$ $C_6H_3Cl_3N_2O_2$ $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	1928-43-4, 145701-23-1 101200-480,	Буудай, эрдэнэшиш, арвай болон овъёосын талбайн хог ургамалд 0,5 – 0,6л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
169	НордСтрим, ВДГ	Пиклорам, 350 г/кг + трибенурон – метил, 200г/кг + флорасулам, 80	$C_6H_3Cl_3N_2O_2$ $C_{15}H_{17}N_5O_6S$	145701-23-1, 101200-480,	Буудай, арвай, хөх тарианы талбайн хог ургамалд 50– 75г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
170	Бомбо, ВДГ	Трибенурон-метил 563г/л+ Флорасулам 187 г/кг	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$ $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	101200-48-0 145701-23-1	Буудай талбайн нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамалд 20-25г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
171	Трейсер, КЭ	Кломазон, 480 г/л	$C_{12}H_{14}ClNO_2$	81777-89-1	Рапсын талбайн хог ургамалд тарихын өмнө 0,25-1,0л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
172	Эсток, ВДГ	Этаметсульфурон-метил, 750 г/кг	$C_{15}H_{18}N_6O_6S$	97780-06-8	Рапсын талбайд 15– 25г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
173	Репер трио, МД	267 г/л Клопиралид /2-этилгексилийн эфир +80 г/л пиклорам + 17 г/л аминопиралид	$C_6H_3Cl_2NO_2$ $C_{16}H_{22}Cl_2O_3$ $C_6H_3Cl_3N_2O_2$	1702-17-6 1928-43-4, 1918-02-1	Рапсын талбайн хос үрийн талт хог ургамалд 0,5-0,65л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
174	Овсюген супер, КЭ	140г/л Феноксапроп –п-этил +47г/л антидот клоквинтосетмексил	$C_{18}H_{16}ClNO_5$, $C_{18}H_{22}ClNO_3$	71283-80-2, 99607-70-2	Буудайн үет хог ургамалд 0,4-0,6л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
175	Хилер, МКЭ	40г/л квизалофоп-п-тефурил	$C_{22}H_{21}ClN_2O_5$	119738-06-6	Рапс, шар буурцгийн талбайн үет хог ургамалд 0,75-1,5л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
176	Арбалет, СЭ	2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 300 г/л +флорасулам 6.25 г/л	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$ $C_{12}H_8F_3N_5O_3S$	1928-43-4 145701-23-1	Үр тарианы талбайн нэг наст, 2,4Д ба 2М-4Х тэсвэртэй болон зарим олон наст хос үрийн

					талт хог ургамлын эсрэг 0,4-0,6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
177	Монолит, ВДГ	Клопиралид 750г/кг	$C_6H_3C_{12}NO_2$	17-02-17-06	Рапс, үр тариа, маалингын талбайн нэг наст хос үрийн талт хог ургамал, хөнөөлтэй үндэслэг ишээр үрждэг олон наст ургамлын эсрэг 90-120г/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
178	Рефери, ВГР	Дикамба 351 г/л	$C_8H_6C_{12}O_3$	1918-00-9	Үр тарианы талбайн зарим нэг наст, 2,4Д ба 2М-4Х тэсвэртэй хог ургамлын эсрэг 0,17-0,2 л/га, зарим олон наст хог ургамлын эсрэг 0,45-0,5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
179	Канон, КЭ	Галоксифоп-Р- метил 104 г/л	$C_{16}H_{13}F_3ClNO_4$	72619-32-0	Рапс, шар буурцагийн талбайн нэг ба олон наст үет хог ургамлын эсрэг 0,5-1,0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
180	Клерк, КЭ	Клетодим 240 г/л	$C_{17}H_{26}ClNO_3S$	99129-21-2	Шар буурцаг, наранцэцэг, рапс, төмсний талбайн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0,2-0,4 л/га, олон наст үет хог ургамлын эсрэг 0,7-1,0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
181	Гарнизон, ВР	Бентазон 480 г/л	$C_{10}H_{12}N_2O_3S$	25057-89-0	Буурцагтан болон үр тарианы нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 1,5-3,0л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
182	Мегалит, ВР	Клопиралид 267 г/л	$C_6H_3C_{12}NO_2$	1702-17-6	Рапсын талбайн зарим нэг болон олон наст, үндсээр үрждэг хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0,3-0,35 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
183	Глифор форте, ВР	Глифосат (калийн давс) 540 г/л	$C_3H_7KNO_5P$	39600-42-5,	Уринш болон хөдөө аж ахуйн зоиулалтай эдэлбэр газрын бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг 1,4-4,0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
184	Ректон, ВР	Дикват (ион) 150 г/л	$C_{12}H_{12}N_2$	2764-72-9	Рапс болон наранцэцгийн үрийн чийгийг бууруулах, нэг наст ургамлын эсрэг 1,5-2,0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
185	Гермес, МД	Хизалофоп-П-этил, 50 г/л Имазамокс, 38 г/л	$C_{19}H_{17}ClN_2O_4$	100646-51-3	Вандуй, шар буурцгийн талбайн үет болон хос үрийн талт хог ургамлыг эсрэг 0,7-1,0 л/га хэрэглэнэ.
186	Тонгара, ВР	Дикват 150 г/л	$C_{12}H_{12}N_2$	2764-72-9	Үр тариа, төмс, сонгино, наранцэцгийн чийгийг бууруулах, хатаах, үр боловсролтыг

					хурдасгах, талбайн үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 1,5-2,0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
187	Галоп, МЭ	Тосны хүчлийн	$C_{16}H_{32}O_6$	68515-73-1 +	0.15-0.20мл/100л усанд, 0,10-0,25%-ийн ажлын шингэнээр
188	Берилл, КЭ	120 г/л клетодим	$C_{17}H_{26}ClNO_3S$	99129-21-2	Шар буурцаг, рапсын талбайн олон наст болон нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0,2-1,0 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
189	Цицерон, ВДГ	250 г/кг римсульфурон	$CH_{17}N_5O_7S_2$	122931-48-0	Төмсний талбайн нэг ба олон наст үет болон хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 50 г/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
190	Гербикс, ВК	500 г/л МЦПА диметиламин	$C_9H_9ClO_3$	2039-46-5	Үр тариа, төмс, вандуйн талбайн нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0,5-1,5 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
191	Глифор, ВР	360 г/л глифосат изопропиламин дайс	$C_6H_{17}N_2O_5P$	38641-94-0	Уриншийн талбайд 2,0-5,0 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
192	Гранпри, ВДГ	750 г/л Трибенуронметил	$C_{15}H_{17}N_5O_6S$	101200-48-0	Үр тарианы талбайн нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 15-25 г/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
193	Сапфир, ВРК	100 г/л Имзетапира	$C_{15}H_{19}N_3O_3$	81335-77-5	Шар буурцаг, вандуйн талбайн нэг ба олон наст үет болон нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 0,5-0,8 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
194	Тристар, КС	500 г/л, прометрин	$C_{10}H_{19}N_5S$	58-33-3	Шар буурцаг, вандуйн талбайн нэг наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг 1,5-3,0 л/га тунгаар 200-300 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
195	Клодинафоп-пропаргил, 150 г/л + Клоквинтосет-мексил, 37.5 г/л	Клодинафоп-пропаргил, 150 г/л + Клоквинтосет-мексил, 37.5 г/л	$C_{14}H_{11}ClFNO_4$ $C_{23}H_{32}N_2O_4$	145701-23-1	Үр тарианы талбайн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0,4-1,2 л/га тунгаар 100-200 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.
196	Феносафrop-P-ethyl 140 g/l + Cloguincat mexyl 50 g/l	Феноксапроп-этил 140г/л+Клогункат мексил 50г/л	$C_{13}H_{19}NO_2S$	62850-32-2	Буудайн талбайн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг 0,4-0,9 л/га тунгаар 150-200 л/га ажлын шингэн орохоор шүршинэ.

197	Glufosinate-Ammonium 20%	Glufosinate-Ammonium 20%	$C_5H_{15}N_2O_4P$	77182-82-2	Уриншийн талбайд
198	Видлер	50 г/л пиноксаден + 12,5 г/л антидот клоквинтосет мексил	$C_{23}H_{32}N_2O_4$ $C_{11}H_8ClNO_3$	243973-20-8 99607-70-2	Үр тарианы талбайн нэг наст үет хог ургамлын эсрэг
199	Диастар	480 г/л диметиламмоны давс дикамба хүчил	$C_8H_6Cl_2O_3$	1918-00-9	Үр тарианы талбайн хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг
200	Эффект	550 г/л 2,4Д дэгдэмхий хэлбэрээр	$C_{16}H_{22}Cl_2O_3$	94-75-7	Үр тарианы талбайн нэг ба олон наст хос үрийн талт хог ургамлын эсрэг
201	Лип	900 г/л, Этоксилат изодециловын спирт	$C_{12}H_{26}O_2$	61827-42-7	Гербицидтэй холимгоор хэрэглэнэ. 0.1% (100 мл/100 л ус) хэмжээгээр, ажлын уусмалын зарцуулалт 100-300 л/га байхаар бэлтгэнэ.
202	Грефф	Гептаметилтрисилоксан, 900г/л + полиалкиленоксид, 100г/л	$C_7H_{22}O_2Si_3$ HO- (CH ₂ -CHR-O) х -H	1873-88-7 25322-68-3	Гадаргуугийн идэвхижүүлэгч, (пестицид болон биоидэвхижүүлэгчтэй хамт хэрэглэнэ)
203	Бэф	900 г/л, Метилированный эфир рапсын тос	$C_{23}H_{36}O_2$	85586-25-0	Пестицидтэй холимгоор хэрэглэнэ.
204	Maty-17	3-sn-фосфатидилетаноламин L-альфа-фосфатидилхолин (шар буурцаг) Филлолиторин Тригептаноин Бензесульфоны хүчил, моно- C11-13 салаалсан алкил деривууд., натрийн давс Метил олеат Ус	$C_9H_{18}NO_8P$ $C_{44}H_{88}NO_8P$ $C_{49}H_{69}N_{11}O_{11}S$ $C_{24}H_{44}O_6$ $C_{18}H_{30}O_3S$ $C_{19}H_{36}O_2$ H_2O	90989-93-8 97281-47-5 87734-77-8 620-67-7 68608-89-9 112-62-9 7732-18-5	Үр тариа, уринш, эрдэнэшишийн талбайн гербицидтэй холимгоор хэрэглэнэ.
205	Органофакт	Органик өөрчлөгдсөн полидиметилсилоксан	$C_{15}H_{38}O_5Si_3$	134180-76-0	Пестицидийн нэвчилтийг сайжруулах. ажлын уусмалын хэмжээг бууруулах 2000 литр тутам 1 литр тунгаар хэрэглэнэ.
206	Уравнитель	Ортофосфорын хүчил 25% хүртэл Гадаргуугийн идэвхит бодис, Ус	H_3PO_4	7664-38-2	Усны pH бууруулна. 1 мл/1л усанд найруулна.
207	CLEANCID (Клеансид)	> 30% зориулалтын ус <5% натрийн гидроксид > 30% ионий бус	NaOH $C_2H_8O_7P_2$ $C_{10}H_{16}N_2O_8$	1310-73-2 2809-21-4 6381-92-6	Усаар шингэлж хэрэглэнэ. 100 л ус тутамд 0.5-1.5 л

		гадаргуугийн идэвхтэй бодисууд <5% оксиэтилен дифосфон хүчил ≤ 1% этилендиаминтетрацетик			
ФУНГИЦИД					
208	Тебу 60, МЭ	Тебуконазол, 60г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Буудай, арвай, хошуу будааны хатуу харуу, тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний эсрэг 0.4-0.5 л/т тунгаар тарих үрийг ариутгахад зааврын дагуу хэрэглэнэ.
209	Бункер, ВСК	Тебуконазол, 60 г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Буудай, арвай, хошуу будааны хатуу харуу, тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний эсрэг 0.4-0.5 л/т тунгаар тарих үрийг ариутгахад зааврын дагуу хэрэглэнэ.
210	Виал ТрасТ, ВСК	Тебуконазол, 60 г/л; Тиабендазол 80 г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O; C_{10}H_7N_3S$	107534-96-3; 148-79-8	Зусах, өвөлжих буудай, арвай, хошуу будааны хатуу болон тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний эсрэг 0.3-0.5 л/т тунгаар тарих үрийг ариутгахад зааврын дагуу хэрэглэнэ.
211	Колосаль, КЭ	Тебуконазол 250г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Үр тарианы ургамлын иш, навч, түрүүний өвчин болох шар,хүрэн, шугаман зэв, гуалах, септориоз, хар ногоон хөгц, торлог толбожилт, рапсын альтернариоз, фомоз зэрэг өвчний эсрэг 0.5-1.0 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
212	Скарлет, МЭ	Имазалил, 100 г/л Тебуконазол, 60 г/л	$C_{14}H_{14}Cl_2N_2O$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	35554-44-0; 107534-96-3	Буудай, арвайн хатуу харуу, тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний

					эсрэг 0.3-0.4 л/т тунгаар тарих үрийг ариутгаж зааврын дагуу хэрэглэнэ.
213	Зэсийн байван	Зэсийн сульфат, 96%	$\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$	7758-99-8	Жимс, жимсгэний мөөгөнцрийн өвчний эсрэг нахиа хөөхөөс өмнө 100-250 мл/ 6-10 бутанд шүршиж хэрэглэнэ.
214	Титул-390, ККР	Пропиконазол, 390г/л	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}_2$	60207-90-1	Ургалтын хугацаанд буудай, арвайн хүрэн ба шар зэв, хүрэн толбожилт, септориоз болон үхэр нүдний септориоз, антракноз, гуалах өвчний эсрэг 0.26-0.32 г/га 126тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
215	Вампер	Пропиконазол, 418г/л	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}_2$	60207-90-1	Буудай, арвай, хошуу будаа, шар буурцагийн ургалтын үеийн мөөгөнцрийн өвчний эсрэг 0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
216	Колосаль Про КМЭ	Пропиконазол 300 г/л Тебуконазол, 200 г/л	$\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{Cl}_2\text{N}_3\text{O}_2$ $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{ClN}_3\text{O}$	60207-90-1; 107534-96-3	Ургалтын хугацаанд үр тарианы ургамал, рапс, чихрийн манжингийн мөөгөнцрийн өвчний эсрэг 0.3-0.6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
217	Формалин	Формальдегид, 37-40%	CH_2O	50-00-0	Дарлага, хүлэмж, зоорь, хоосон агуулахыг 0.5-4%-ийн уусмалаар ариутгах зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
218	Ридомил голд МЦ, ВДГ	Манкоцеб, 640г/кг+Мефеноксам 40г/кг	$\text{C}_4\text{H}_8\text{MnN}_2\text{S}_4\text{Zn};$ $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{NO}$	8018-01-7; 70630-17-0	Ургамлын ургалтын үед төмс, лоолийн фитофтор, альтернариоз, хэмх, сонгинын хуурмаг гуалах өвчний эсрэг 2.5 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
219	Метаксил, СП	Манкоцеб, 640 г/кг Металаксил 80 г/кг	$\text{C}_4\text{H}_6\text{MnN}_2\text{S}_4\text{Zn};$ $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{NO}$	8018-01-7; 57837-19-1;	Төмс, ил талбайн лоолийн фитофтор, альтернариоз, хэмхийн хуурамч гуалах өвчний эсрэг 2-2.5 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
220	Манкоцеб, СП	Манкоцеб, 70%, 80%	$\text{C}_4\text{H}_6\text{MnN}_2\text{S}_4\text{Zn};$	8065-67-6	Төмс, лоолийн фитофтор, альтернариоз өвчний эсрэг 1.2-1.6 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
221	Дитан	Манкоцеб, 75%	$\text{C}_4\text{H}_6\text{MnN}_2\text{S}_4\text{Zn};$	8065-67-6	Төмс, лоолийн фитофтор, альтернариоз өвчний эсрэг 1.2-1.6 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
222	Максим, КС	Флудиоксонил, 25г/л	$\text{C}_{12}\text{H}_6\text{F}_2\text{N}_2\text{O}_2$	131-341-86-1	Төмсний мөөгөнцрийн өвчний эсрэг үрийн төмсийг тарихын өмнө 0.2-0.4 л/т тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

223	Коллоид хүхэр	Хүхэр, 800г/кг	S	10544-50-0	Хүнсний ногоо, хүлэмжийн таримлын гуалах, хар хөл, цахлай зэрэг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг ургалтын хугацаанд 0.4%-ийн уусмалаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
224	Тиовит Джет, ВДГ	Хүхэр, 800г/кг	S	10544-50-0	Хүлэмжийн таримлууд болон жимс жимсгэний гуалах өвчний эсрэг ургалтын хугацаанд 2-3 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
225	ТМТД, ВСК	Тирам, 400г/л	C ₆ H ₁₂ N ₂ S ₄	137-26-8	Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны мөөгөнцөр, бактерийн өвчний эсрэг тарилтын өмнө үр ариутгалыг 3-4 л/т тунгаар зааврын дагуу хийнэ.
226	ХОМ, СП	Хлорт зэс, 861г/кг	CuCl ₂ •3 Cu (OH) ₂	11078-26-5	Төмс, лоолийн фитофтор, альтернариоз, хэмхийн хуурамч гуалах өвчний эсрэг 2.5 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
227	Ордан, СП	Хлорт зэс, 689г/кг +цимоксанил, 42 г/кг.	CuCl ₂ •3Cu (OH) ₂ ; C ₇ H ₁₀ N ₄ O ₃	11078-26-5; 57966-95-7	Төмс, лоолийн фитофтор, альтернариоз, хэмх, сонгины хуурамч гуалах өвчний эсрэг 2.0-2.5 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
228	Акробат, WP	Диметоморф, 50%	C ₂₁ H ₂₂ ClNO ₄	110488-70-5	Төмсний фитофтор, альтернариоз өвчний эсрэг ургамал ургалтын хугацаанд 0.40-0.45 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
229	Кабро тем, WG	Пиракlostробин, 6.7% Диметоморф-81.3%	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₄ ; C ₂₁ H ₂₂ ClNO ₄	175013-18-0; 110488-70-5	Үндэс үрт таримал, төмс, ил талбайн лооль, хэмх, гуатны төрлийн таримлын мөөгөнцрийн гаралтай өвчний эсрэг 1.82-1.84 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
230	Кабрио Топ, ВДГ	Метирам, 550г/кг + Пиракlostробин, 50 г/кг	C ₁ H ₆ N ₂ S ₄ Zn; C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₄ ;	9006-42-2; 175013-18-0	Гоёл чимэглэлийн ургамал, нэг ба олон наст өвслөг ургамал, зүлэгний мөөгөнцрийн гаралтай өвчний эсрэг 1.5-2 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
231	Опера Нью, SE	Эпоксиконазол, 62.5г/л Пиракlostробин, 85 г/л	C ₁₇ H ₁₃ ClFN ₃ O; C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₄ ;	133855-98-8; 175013-18-0	Үр тарианы таримлын мөөгөнцрийн гаралтай өвчний эсрэг ургамал ургалтын үед 1-1.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
232	Абакус ультра	Эпоксиконазол, 62.5г/л Пиракlostробин, 62.5 г/л	C ₁₇ H ₁₃ ClFN ₃ O; C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₄ ;	133855-98-8; 175013-18-0	Үр тарианы таримлын мөөгөнцрийн гаралтай өвчний эсрэг ургамал ургалтын үед 1-1.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

233	Фолмекс	Тебуконазол, 250г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Үр тарианы тарималд өргөн тархсан мөөгөнцрийн өвчний эсрэг үрийг тарихын өмнө 0.1 л/т тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
234	Оплот, ВСК	Дифеноконазол, 90г/л Тебуконазол, 45г/л	$C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$; $C_{16}H_{22}ClN_3O$	119446-68-3; 107534-96-3	Үр тарианы тоосон ба хатуу харуу, үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, толбожилт өвчний эсрэг тарилтын өмнө 0,4-0,6 л/т тунгаар үрийн ариутгал хийхэд хэрэглэнэ.
235	Иншүр,	Пиракlostробин 17г/л Пропиконазол, 17г/л Металаксил 17 г/л	$C_{19}H_{18}ClN_3O_4$; $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ $C_{15}H_{21}NO$	175013-18-0; 60207-90-1 57837-19-1;	Үр тарианы таримлын мөөгөнцрийн өвчний эсрэг үрийг тарихын өмнө 300 мл/ 100 кг тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
236	Раёк, КЭ	Дифеноконазол, 250г/л	$C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$;	119446-68-3	Төмс, лоолийн альтернариоз, чихрийн ба тэжээлийн манжингийн церкоспориоз, альтернариоз, хуурамч гуалах өвчний эсрэг ургамал ургалтын үед 0,3-0,4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
237	Тебуконазол, КС	Тебуконазол, 60г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Үр тарианы таримлын үрийн өвчин үүсгэгч мөөгөнцрийн эсрэг 0,4-0,5 л/т тунгаар тариалахын өмнө үрийг зааврын дагуу ариутгана.
238	Тирам, WP	Тирам, 80%	$C_6H_{12}N_2S_4$	137-26-8	Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны олон төрлийн мөөгөнцөр, бактерийн өвчний эсрэг 1.5-6.0 кг/т тунгаар үрийг ариутгаж хэрэглэнэ.
239	Гимнаст, СП	Манкоцеб, 600г/кг +диметоморф 90 г/кг	$C_4H_6MnN_2S_4Zn$ $C_{21}H_{22}ClNO_4$	8065-67-6; 110488-70-5	Төмсний фитофтор, альтернариоз, хэмхийн хуурамч гуалах өвчний эсрэг 2,0 кг/га тунгаар ургамал ургалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
240	Пропамакс	Пропамокарб гидрохлорид, 66.5% (722г/л)	$C_9H_{21}ClN_2O$	24579-73-5	Төмс, лоолийн фитофтор, хүнсний ногооны хар хөл өвчний эсрэг хэрэглэнэ.
241	Кумир, СК	Зэсийн сульфат, 345 г/л	$CuH_{10}O_9S$	021-02-531-1	Төмсний альтернариоз, фитофтор өвчний эсрэг 5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
242	Бенорад	Беномил, 500 г/кг	$C_{14}H_{18}N_4O_3$	021-02-1741-1	Үр ариутгалын фунгицид / үрийн өвчний эсрэг 2-3 кг/т тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
243	Диниконазол	Диниконазол, 12.5%	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O$	83657-24-3	Үр тарианы ургамлын үрийн болон ургалтын үеийн өвчний эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.

244	Ширма, КС	Флуазилам, 500 г/л	$C_{13}H_4Cl_2F_6N_4O_4$	79622-59-6	Төмсний ургалтын үеийн өвчний эсрэг 0.3-0.4 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
245	Пропи Плюс	Пропиконазол, 250г/л	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$	60207-90-1	Гүзээлзгэнэ, үхэр нүд, тошлой, бөөрөлзгөний өвчний эсрэг 0.5 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
246	Ревус, КС	Мандипропамид, 250г/л	$C_{23}H_{22}ClNO_4$	374726-62-2	Төмс, лоолийн фитофтор, бөөрөнхий сонгины хуурмаг гуалах өвчний эсрэг 0.5-0.6 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
247	Бордогийн холимог	Зэсийн сульфат + кальцийн гидроксид	$CuSO_4; +CaOH_2$	8011-63-0	Жимс жимсгэнэ, хүнсний ногооны мөөгөнцрийн өвчний эсрэг 1%-ийн уусмалаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
248	Синклер, СК	Флудиоксонил, 75г/л	$C_{12}H_6F_2N_2O_2$	131341-86-1	Буудайн үрийн өвчин болон үрийн зориулалттай төмсний хадгалалтын үеийн өвчин, төмсний зарим ургалтын үеийн өвчний эсрэг тарих буудайн үр ба үрийн төмсийг 0,2-0,6 л/т тунгаар тарихын өмнө ба үрийн төмсийг хадгалалтад оруулахын өмнө зааврын дагуу ариутгана.
249	Тебуконазол	Тебуконазол, 60г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Үр тарианы таримлын үрийн өвчин үүсгэгч мөөгөнцрийн эсрэг 0,4-0,5 л/т тунгаар тариалахын өмнө үрийг зааврын дагуу ариутгана.
250	Төмрийн байван	Төмрийн сульфат 53%-иас багагүй	$FeSO_4$	7720-78-7	Ургамлын өвчний эсрэг урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх зорилгоор 0,3-5%-ийн уусмал бэлтгэн зааврын дагуу хэрэглэнэ.
251	Афепаз шахмал хүхэр	Хүхэр, 99,5%	S	10544-50-0	Афепаз шахмал хүхрийг Нивола ууршуулагч төхөөрөмжинд хийж, хүлэмжинд гуалах, саарал илжрэл зэрэг мөөгөнцрийн өвчний эсрэг утлага хийхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
252	Менно Флорадес ариутгалын хөөс	Бензойны хүчил, 90 г/л	C_6H_5COOH	65-85-0	Хөгц мөөгөнцөр бактери вирусын эсрэг хүлэмжийн хана тааз, тавиур, эд анги, багаж хэрэгслийн ариутгалд 2-4%-ийн уусмал байдлаар хөөсөн шүршилт хийхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
253	Споргон	Прохлораз 46%	$C_{15}H_{16}Cl_3N_3O_2$	67747-09-5	Саримсын хөгц мөөгөнцрийн өвчний эсрэг үр ариутгал хийхэд 1,5кг/т тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

254	Метамил МЦ, ВДГ	Манкоцеб 640г/кг, Металаксил 80г/кг	$C_4H_6MnN_2S_4Zn$; $C_{15}H_{21}NO$	8018-01-7; 57837-19-1;	Төмсний фитогтор, альтернариоз өвчинтэй тэмцэхэд 2-2,5 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
255	Пропиконазол Тебуконазол	Пропиконазол 200г/л, Тебуконазол 200г/л	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	60207-90-1 107534-96-3	Буудайн ургалтын үеийн хүрэн зэв, шар зэв болон ишний зэв, гуалах, септориоз өвчний эсрэг 0,15-0,3 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
256	Купролюкс	Хлорт зэс 689,5г/кг, Цимоксанил 42г/кг	$CuCl_2 \cdot 3Cu(OH)_2$ $C_7H_{10}N_4O_3$	11078-26-5 57966-95-7	Өрхийн тариаланд төмс, хүнсний ногооны фитогтор болон хуурмаг гуалах өвчинтэй тэмцэхэд 6,5 гр-ыг 25 м² талбайд орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
257	Профит Голд	Цимоксанил 250г/кг, фамоксадон 250г/кг	$C_7H_{10}N_4O_3$ $C_{22}H_{18}N_2O_4$	57966-95-7 131807-57-3	Өрхийн тариаланд төмс, хүнсний ногооны фитогтор, альтернариоз болон хуурмаг гуалах өвчинтэй тэмцэхэд 3 гр-ыг 50 м² талбайд орохоор тооцон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
258	Проксима КС	Азоксистробн 10г/л., Тебуконазол 15г/л., Флудиоксонил 25г/л	$C_{22}H_{17}N_3O_5$; $C_{16}H_{22}ClN_3O$; $C_{12}H_6F_2N_2O_2$	131860-33-8 107534-96-3 131341-86-1	Буудай, арвайн үрийг өвчнөөс хамгаалах зорилгоор 1.5-1.75 л/тн тунгаар зааврын дагуу үрийг ариутгаж хэрэглэнэ.
259	Прогноз КЭ	Пропиконазол 250г/л	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$	60207-90-1	Үр тарианы ургамлыг өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эмчлэх, тархалтыг зогсоох үйлчилгээтэй, ургалтын үед 0.5л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
260	Гранберг, КЭ	Тебуконазол 250г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Үр тарианы таримлыг өвчнөөс хамгаалах ба ургалтын хугацаанд 0.5-1л/га тунгаар зааврын дагуу шүршинэ.
261	Идикум, СК	Ипродион, 133 г/л, имидаклоприд, 100 г/л, дифеноконазол, 6,7 г/л	$C_{13}H_{13}Cl_2N_3O_3$ $C_9H_{10}ClN_5O_2$ $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$	36734-19-7 138261-41-3 119446-68-3	Төмсний булцууг тарих үед мөрөнд нь хар цахлай, фузариоз, антракноз өвчин болон бөөс, няслуур цохын авгалдай-"утсан өт"-ний эсрэг 3-4,5л/га тунгаар шүршиж ариутгана.
262	Интрада, СК	Азоксистробин 250г/л	$C_{22}H_{17}N_3O_5$	131860-33-8	Төмсний хар цахлай, мөнгөлөг цахлайн эсрэг булцууг мөрөнд хийх үед 1л/га тунгаар шүршиж ариутгана.
263	Депозит, МЭ	Имазалил 40г/л Металаксил 30 г/л Флудиоксонил 40 г/л	$C_{14}H_{14}Cl_2N_2O$ $C_{15}H_{21}NO$ $C_{12}H_6F_2N_2O_2$	35554-44-0 57837-19-1; 131341-86-1	Төмсний хар цахлай, фузариозын эсрэг тарихын өмнө булцууг 0,25-0,4л/т тунгаар ариутгана.

264	Депозит суприм, МЭ	Имазалил, 40 г/л Мефеноксим, 15 г/л Флудиоксонил 40 г/л	$C_{14}H_{14}Cl_2N_2O$ $C_{15}H_{21}NO$ $C_{12}H_6F_2N_2O_2$	35554-44-0 57837-19-1; 131341-86-1	Төмсний хар цөхлай, фузариозын эсрэг тарихын өмнө булцууг 0,25-0,4л/т тунгаар ариутгана.
265	Титул дуо, ККР	Пропиконазол-200г/л + Тебуконазол 200г/л	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	60207-90-1 107534-96-3	Буудайн ургалтын хугацаанд туг навч гарах үед хүрэн зэв, шар зэв, септориоз өвчний эсрэг, түрүүний фузариозын эсрэг түрүүлэлтийн төгсгөл-цэцэглэлтийн эхэнд 0,25-0,4л/га тунгаар шүршинэ.
266	Грандсил, КС	Тебуконазол 60г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$	107534-96-3	Буудай, арвай, хошуу будааны ургамлын үндэсний илжрэл, үрийг хөгц, тоосон харуу, хатуу харуу, улаан хүрэн толбожилт өвчний эсрэг 0,4-0,5л/т тарихын өмнө тунгаар ариутгана.
267	Грандсил ультра, КС	Тебуконазол 45г/л Имизалил 20г/л Флутриафол 75 г/л	$C_{16}H_{22}ClN_3O$ $C_{14}H_{14}Cl_2N_2O$ $C_{16}H_{13}F_2N_3O$	107534-96-3 35554-44-0 76674-21-0	Буудай, арвай, хошуу будааны үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, тоосон харуу, хатуу харуу, торон толбожилт, улаан хүрэн толбожилт өвчний эсрэг 0,4-0,5л/т тунгаар тарихын өмнө үрийг ариутгана.
268	Титул трио, ККР	Пропиконазол 80г/л Тебуконазол 160г/л Ципроконазол	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$ $C_{15}H_{18}ClN_3O$	60207-90-1 107534-96-3 94361-06-5	Буудай, арвайг ургамал ургалтын хугацаанд хүрэн зэв, септориоз, түрүү харлах, хүрэн – улаан толбожилт, торон толбожилт өвчний эсрэг 0,4-0,6л/га тунгаар шүршинэ.
269	Сиелоту ариутгагч, (шахмал, нунтаг)	Хлорын давхар исэл	ClO_2	10049-04-4	1000-2000 дахин шингэлж, тарилтын өмнө хөрсийг усалж ариутгана. 2000 дахин шингэлсэн уусмалаар жимс, ногоог ариутгана. 5000 дахин шингэлсэн уусмалаар ургамалд шүршилт хийх, хөрсийг услах аргаар ариутгана.
270	Виталон	Тирам 400 г/л Тебуконазол 14 г/л	$C_6H_{12}N_2S_4$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	137-26-8 107534-96-3	Буудай, арвай, эрдэнэшиш, шар буурцаг, вандуйн үрийг хатуу ба тоосон харуу, гельминтоспориозын ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, навчны ба түрүүний септориоз өвчний эсрэг тарихын өмнө 1.5-2.0л/т тунгаар үрийг ариутгана.
271	Азоксит	Азоксистробин 200г/л Тебуконазол 160г/л	$C_{22}H_{17}N_3O_5$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	131860-33-8 107534-96-3	Буудайн навчны хүрэн зэв, навчны толбожилт, шар зэв, гуалах, түрүүний септориоз, ишний шугаман зэв, түрүүний фузариоз, арвайн давжаа харуу,

					ринхоспориоз, арвайн торон толбожилт, арвайн хар хүрэн толбожилт, наранцэцгийн альтернариоз, цагаан илжрэл, хуурмаг гуалах, цагаан толбожилт, ишний саарал толбожилт, фомоз, шар буурцгийн аскохитоз, хуурмаг гуалах, септориоз, цагаан илжрэл, фомопсис, вандуйн ба шар буурцгийн фузариоз зэрэг өвчний эсрэг 0.8-1.0л/га тунгаар шүршинэ.
272	Альтазол форте	Пропиконазол-300г/л Тебуконазол-200г/л	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	60207-90-1 107534-96-3	Үр тарианы хүрэн зэв, ишний зэв, шар зэв, түрүүний ба навчны септориоз, гуалах, пиренофороз, түрүүний фузариоз, рапсын альтернариоз, гуалах, фомоз өвчний эсрэг 0.3-0.6л/га тунгаар шүршинэ.
273	Азорит	Азоксистробин 200 г/л Ципроконазол,80 г/л	$C_{22}H_{17}N_3O_5$	131860-33-8 94361-06-5	Үр тарианы хүрэн зэв, ишний зэв, түрүүний ба навчны септориоз, түрүү харлах, гуалах, хүрэн толбожилт, түрүүний фузариоз зэрэг өвчний эсрэг 0.5-1.0л/га тунгаар шүршинэ.
274	Тебалин	Имазалил 100 г/л Тебуконазол 60 г/л	$C_{14}H_{14}Cl_2N_2O$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	35554-44-0 107534-96-3	Буудай, арвайн тоосон ба хатуу харуу, гельминтоспориозын ба фузариозын үндэсний илжрэл, ризоктониоз, үрийн хөгц, гуалах, шар буурцаг, вандуйн фузариозын үндэсний илжрэл, аскохитоз, фузариозын сульдаа, үрийн хөгц зэрэг өвчний эсрэг 0.3-0.4л/т тунгаар үрийг ариутгана.
275	Дуалшилд	Флудиоксонил 25 г/л Металаксил 38г/л	$C_{12}H_6F_2N_2O_2$ $C_{15}H_{21}NO_4$	119446-68-3 70630-17-0	Буудайн гельминтоспориозын ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, хатуу харуу, гуалах, арвайн хатуу харуу, фузариозын ба 265гельминтоспориозын үндэсний илжрэл, төмсний ризоктониоз, фузариоз, цахлай, фитофтор, хуурай илжрэл, рапсын үрийн хөгц, аскохитоз, фузариоз, фомоз, шар буурцгийн үрийн хөгц, аскохитоз, фузариоз өвчний эсрэг 3.0-4.0л/т тунгаар үрийг ариутгана.
276	Протиомакс	Протиоконазол 210 г/л Тебуконазол 210г/л	$C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$ $C_{16}H_{22}ClN_3O$	178928-70-6 107534-96-3	Үр тарианы хүрэн зэв, ишний зэв, шар зэв, навчны ба түрүүний септориоз, түрүүний фузариоз, гуалах, рапсын альтернариоз, фомоз, хар хөл, наранцэцгийн фомоз, зэв,

					цагаан ба саарал илжрэл, шар буурцаг, вандуйн хүрэн толбожилт, аскохитоз, антракноз зэрэг өвчний эсрэг 0.15-0.45л/га тунгаар шүршинэ.
277	Эпомакс	Эпоксиконазол50г/л Пиракlostробин133г/л	$C_{17}H_{13}ClFN_3O$ $C_{19}H_{18}ClN_3O_4$	106325-08-0 175013-18-0	Буудайн иш, навчны зэв, гуалах, навчны ба түрүүний септориоз, арвайн одой зэв, хар хүрэн толбожилт, пиренофороз, эрдэнэшишийн фузариоз, цэврүүт харуу, үндэс орчмын ба ишний илжрэл, гельминториоз, наранцэцгийн ишний илжрэл, антракноз, шар буурцаг, вандуйн хуурмаг гуалах, аскохитоз, хүрэн толбожилт зэрэг өвчний эсрэг 0.5-1.0л/га тунгаар шүршинэ.
278	Амистар экстра	Азоксистробин, 200 г/л + Ципроконазол 80 г/л	$C_{22}H_{17}N_3O_5$	131860-33-8 94361-06-5	Үр тарианы хүрэн зэв, ишний зэв, түрүүний ба навчны септориоз, түрүү харлах, гуалах, хүрэн толбожилт, түрүүний фузариоз зэрэг өвчний эсрэг 0.45-0.75л/га тунгаар шүршинэ.
279	Грифон	Ацетамиприд, 100 г/л Флудиоксонил, 25 г/л Дифеноконазол,25 г/л	$C_{10}H_{11}ClN_4$ $C_{12}H_6F_2N_2O_2$ $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$	135410-20-7 119446-68-3 131341-86-1	Үр тарианы үетний ялаа, ишний үсрэгч цох, гельминтоспориозын ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, хатуу харуу, төмсний утсан өт, буглаа цох, ризоктониоз, фузариоз, мөнгөлөг цахлай зэрэг өвчин, хортны эсрэг 0.4-1.5л/т тунгаар үрийг ариутгана.
280	Тебуконазол Имадаклоприд	Тебуконазол 0.8% имадаклоприд 10.2%	$C_{16}H_{22}ClN_3O$ $C_9H_{10}ClN_5O_2$	107534-96-3 138261-41-3	Үр тарианы септориоз, навчны зэв, хатуу харуу, тоост харуу, фузариозын ба үндэсний илжрэл, үрийн хөгц зэрэг өвчин, үрэн дэх хортон шавжийн эсрэг 0.4-0.5л/т тунгаар үрийг ариутгана.
РОДЕНТИЦИД					
281	Бромадиолон	Бромадиолон, 0.5%	$C_{30}H_{23}BrO_4$	28772-56-7	Агуулах, бэлчээр, тариалангийн талбайн мэрэгчидтэй тэмцэхэд 0.005% 2-3 кг/га тунгаар /1 нүхэнд 10г/ зааврын дагуу хэрэглэнэ
282	Изоцин, БФК, МК	Бродифакум 2г/л	$C_{11}H_{20}N_2O_5$	27317-69-7	Агуулах, бэлчээр, тариалангийн талбайн мэрэгчидтэй тэмцэхэд 0.006% 2-3 кг/га

					тунгаар/ 1 нүхэнд 10г /зааврын дагуу хэрэглэнэ.
283	Бромадиолон RB	Бромадиолон, 0,005%	C ₃₀ H ₂₃ BrO ₄	28772-56-7	Бэлчээр, тариалангийн болон агуулахын хөнөөлт мэрэгчдийн эсрэг 0.5-1.0 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
284	Триптолид GR	Триптолид, 0,25мг/кг	C ₂₀ H ₂₄ O ₆	38748-32-2	Бэлчээр, тариалангийн болон агуулахын хөнөөлт мэрэгчдийн эсрэг 0.5-1.2 кг/га, 5-10 гр/10х20м2 параллель дэвсэгт зааврын дагуу хэрэглэнэ.
285	Бродимон	Бромадиолон, 0,005%	C ₃₀ H ₂₃ BrO ₄	28772-56-7	Бэлчээр, тариалангийн болон агуулахын хөнөөлт мэрэгчдийн эсрэг 2-3 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

Хоёр. 2025 онд хөдөө аж ахуйд ашиглах пестицидийн тоо, хэмжээ

Д/д	Нэр, төрөл	Зориулалт, ашиглах хэмжээ /тн-оор/						Бүгд /тн-оор/
		Бэлчээрийн хөнөөлт шавьж, мэрэгчтэй тэмцэх	Ойн хөнөөлт шавьж, өвчинтэй тэмцэх	Таримал ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамалтай тэмцэх	Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны агуулах, зoorь ариутгал	Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны үр ариутгал	Уриншийн хог ургамалтай	
1.	Инсектицид	30	50	70	50	-	-	200
2.	Гербицид	-	-	800	-	-	950	1750
3.	Фунгицид	-	60	160	40	60	-	320
4.	Родентицид	10	-	20	-	-	-	30
	Нийт							2300

Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд,
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,
Эрүүл мэндийн сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн
А/72, А/44, А/42 дугаар хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралт

МОНГОЛ УЛСАД 2025 ОНД ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР
АШИГЛАЖ БОЛОХ ХИМИЙН БОРДООНЫ ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ

Д/д	Худалдааны нэр	Үйлчлэх бодисын нэр, агууламж	Томъёо	Хэрэглэх хэмжээ, мян. тн	Зориулалт
1	Шүвтрийн шүү (35-0-0) /Аммиачная селитра, Ammonium Nitrate/	Аммонийн нитрат, 34-35%	NH_4NO_3	30.0	Таримлын төрлөөс хамааран бордоонуудыг хамтад нь хөрс боловсруулалт ба тарилтын үед зөвлөсөн тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
2	Фосфорын бордоо (0-46-0) /Двойной суперфосфат/	Фосфорын исэл (P_2O_5) 42-46%	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	20.0	
3	Калийн бордоо /Хлорт кали, Potassium chloride/	Калийн исэл (K_2O) 60-62%	KCl	10.0	
4	Мочевин /Urea/ (46-0-0) (Шүвтэр)	Азот (N) 45-46%	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$	18.0	Үрийн чанарыг сайжруулах зорилгоор 40 кг/га тунгаар тарилтын ба ургалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ.
5	Аммонийн фосфат /DAP-Diammonium Phosphate/	Азот (N) 18-21%; Фосфорын исэл (P_2O_5) 46-53%	$(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$	18.0	Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
6	Моно аммонийн фосфат /MAP-Mono ammonium Phosphate/	Азот (N) 11-18%; Фосфорын исэл (P_2O_5) 48-55%	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	18.0	Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
7	Азот, фосфорын нийлмэл бордоо (26-18-0) /Complex fertilizer/	Азот (N) 26%; Фосфорын исэл (P_2O_5) 18%	N; P_2O_5	20.0	Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
8	Нийлмэл бордоо /NPK-Complex fertilizer/	Азот (N) 0≤60%;	N; P_2O_5 ; K_2O	22.0	Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон

		Фосфорын исэл (P_2O_5) 0≤40%; Калийн исэл (K_2O) 0≤40% (бордооны үйлчлэх бодисуудын агууламж нь тэг буюу түүнээс дээш байх ба заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна)			таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
9	Интермаг Профи цуврал	Азот -15%, магнийн исэл-2- 2,5 %, хүхрийн исэл 1,8- 4,5%, бор-0,4-0,5%, зэс – 0,2-0,9%, төмөр 0,2- 0,8%, марганец 0,6- 1,1%, молебден- 0,005%, цайр 0,5-1,0%	N; MgO , Fe; Cu; Mn, SO_3 , B, Mo, Zn	2.0	Үр тарианы болон төмс, хүрэн манжин ба олон наст өвслөг ургамлыг бордох зориулалтаар зааврын д агуу хэрэглэнэ.
10	Ультрамаг Бор	Бор (B) 11%	B	2.0	Чихрийн манжин, төмс, хүнсний ногоо, жи мс жимсгэнэ бороор дутагдсан үед заавр ын дагуу хэрэглэнэ.
11	PER-4 Max	Азот (N)10-30%, Төмөр (Fe) 5- 15%, Магни (Mg) 1- 10%, Манган (Mn), 1-5%	N; Fe; Mg; Mn	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 5- 10 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
12	ProteSyn	Азот (N) 10-25%; фосфорын исэл (P_2O_5) 1- 15%; калийн исэл (K_2O) <1%	N; P_2O_5 ; K_2O	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 20- 25 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
13	PK Fight	Фосфорын исэл (P_2O_5)20- 50%;калийн исэл (K_2O) 5-25	P_2O_5 ; K_2O	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 10-15 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
14	Carbon N	Азот (N) 20-40%;	N	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 5-8 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
15	Planet Turf (11-22-14)	Азот (N) 11%; фосфорын исэл (P_2O_5) 22%; калийн оксид (K_2O) 14%; магни (Mg) 1%; хүхэр (S) 5.5%; төмөр (Fe) 1%	N; P_2O_5 ; K_2O ; Mg; S; Fe	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 20- 26 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
16	PT-PRO (26-0-0)	Азот (N) 26%; хүхэр (S) 8%	N; S	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 25- 30 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ

17	Planet Turf (24-4-12)	Азот (N) 4%; фосфорын исэл (P_2O_5) 4%; калийн оксид (K_2O) 12%; кальци (Ca) 7%;	N; P_2O_5 ; K_2O ; Ca;	2.0	Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 24-32 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
18	Байцаанд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо	N-22%, P_2O_5 – 10%, K_2O -16%	N: P_2O_5 : K_2O	2.0	Бөөрөнхий, улаан толгойт, брюсель, савой, өнгөт, брокколи, кольраб болон хятад байцааны үндсэн ба нэмэлт бордооны зориулалтгаар (50 г бордоо $1m^2$ талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ.
19	Сонгино, сармисанд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо	N - 18%, P_2O_5 – 18%, K_2O -18%	N: P_2O_5 : K_2O	2.0	Бөөрөнхий, батун, сарвуун зэрэг бүх төрлийн сонгино, сармисны үндсэн сонгомол эрдэс бордоо. ургамлын өсөлт, хөгжил, жимслэлтийг дэмжихэд (60г бордоо $1m^2$ талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ.
20	Хэмх, хулуунд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо	N - 22%, P_2O_5 – 10%, K_2O -16%	N: P_2O_5 : K_2O	2.0	Өргөст хэмх, хулуу, хурган гуа, амтат гуа зэрэг тарималд үндсэн болон нэмэлт бордоо болгон ургамлын өсөлт, хөгжил, жимслэлтийг дэмжих зорилгоор (40-60г бордоо $1m^2$ талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ.
21	Лооль, чинжүү, цэсэнд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо	N - 12%, P_2O_5 – 10%, K_2O -22%	N: P_2O_5 : K_2O	2.0	Лооль, чинжүү, хаш зэрэг чэсэнцрийн овгийн тарималд үндсэн болон нэмэлт бордоо болгон ургамлын өсөлт, хөгжил, жимслэлтийг дэмжих зорилгоор (60г бордоо $1m^2$ талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ.
22	Calcium Nitrate Ducanit	Кальцийн нитрат	CaN_2O_6	5.0	Гидропоник хүлэмжинд тэжээлт орчин бүрдүүлэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
	Ammonium Sulphate	Аммонийн сульфат	$(NH_4)_2SO_4$	0.4	
	Potassium Nitrate	Калийн нитрат	KNO_3	4.0	
	Nitric Acid 68%	Азотын хүчил- 68%	HNO_3	3.0	
	Libfer SP 6% Fe-EDDHA	ЛибферТөмөр-6%	Байхгүй (тогтворж уулагч)	0.3	
	Fe- DTPA 11%	Төмөр-11%	$C_{14}H_{26}FeN_5O_{10}$	0.1	
	Monopotassium-phosphate	Фосфор хүчлийн кали (1-халагдсан)	KH_2PO_4	2.0	

	Potassium Sulphate	Калийн сульфат	K_2SO_4	0.6	
	Magnesium Sulphate	Магнийн сульфат	$MgSO_4 \cdot 7(H_2O)$	0.8	
	Easygro Mn-EDTA 13%	Манган 13%	$C_{10}H_{12}N_2O_8Mn(NH_4)_2$	0.5	
	Easygro Zn-EDTA 15%	Цайр 15%	$C_{10}H_{12}N_2O_8Zn \cdot 2Na$	0.03	
	Borax	Борын хүчлийн натри	$B_4H_{20}Na_2O_{17}$	0.03	
	Easygro Cu-EDTA 14%	Зэс 14%	$C_{10}H_{12}CuN_2O_8 \cdot 2Na$	0.03	
	Sodium molybdate 39%	Натрийн молибдат 39%	$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$	0.03	
23	Борная кислота	Борын хүчил, 17,0- 98,6%	H_3BO_3	1.5	Үрийн ургалтыг дэмжих, цэцэглэлтийг сайжруулах, ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гүзээлзгэнэ, төмс, хүрэн манжин ба бусад хүнсний ногоо, гоёл чимэглэлийн ургамалд бордоо болгон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
24	Магний сернокислый	Магнийн сульфат / Магнийн исэл (MgO)-16.0-17,0%, Хүхэр (S) -12.8-13,0%/	$MgSO_4$	1.5	Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний таримлыг бордоход зааврын дагуу хэрэглэнэ.
25	Карбамид	Азот 46,2%	$(NH_2)_2CO$	15.0	Жимсний мод, бут, хүнсний ногоонд үндсэн ба нэмэлт бордоо болгон зааврын дагуу хэрэглэнэ.
26	Агрикола (Цуврал бордоо) - цахирмаа - шилмүүст - тасалгааны ургамал - сарнай - дал мод - кактус - чимэглэлийн навчит ургамал - олон талт - төмс -зүлэг	Азот, Фосфор, Кали, Бичил элементүүдийг (Бор, Зэс, Цайр, Магни, Маргенец, Төмөр, молибден ба бусад) янз бүрийн хэмжээтэй агуулна.	N, P_2O_5 , K_2O , B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo, MgO ...	5.0	Өрхийн аж ахуйд хүнсний ногоо, цэцэг ба гоёл чимэглэл, тасалгааны ургамал болон тухайлсан ургамалд зориулан хэрэглэх бордоо
27	Аммофос	Азот -12%; Фосфор -52%	N, P_2O_5	10.0	Бүх тарималд болон хөрсөнд зааврын дагуу хэрэглэнэ.

28	Сульфат калия	Калийн сульфат, 45%	K_2SO_4	10.0	Төмс, хүнсний ногоо, жимсний мод ба хөрсөнд зааврын дагуу хэрэглэнэ.
29	Нитрофоска	азот (N-8-52%); фосфор (P 1,7-7%) ба кали (K 5,8-19,9%),	N; P_2O_5 ; K_2O	10.0	Бүх таримал ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
30	Азофоска	азот (N), фосфор (P) ба кали (K), NPK 16:16:16.	N; P_2O_5 ; K_2O	10.0	Бүх таримал ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
31	14-Hydroxylated Brassinosteroid 0.0075 %SL	14-Гидрооксид Брассиностероид, 0.0075%	$C_{28}H_{48}O_6$.	1.5	Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
		АЕО-9 – (Хуурай сүү ба этилен оксидын кондeнсат /эмульс/), 1%	$C_2CH_{25}O (CH_2CH_2O)_9CH_3$.		
		Этилен гликол, 10%	$C_2H_6O_2$		
		Этилийн спирт, 20%	C_2H_5OH		
		Ус, 100% эзлэхүүн хүртэл	H_2O		
32	N-Power (NPK + TE foliar fertilizer)	Нийт азот, 15%	N	6.0	Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
		Фосфор, 25%	P_2O_5		
		Кали, 13%	K_2O		
		Манган, 0.1%	Mn		
		Цайр, 0.1%	Zn		
		Бор, 0.1%	B		
		Молибден, 0.02%	Mo		
		Celatom 100 % хүртэл			
33	K-Power (NPK + TE foliar fertilizer)	Нийт азот, 5%	N	1.5	Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
		Фосфор, 5%	P_2O_5		
		Кали, 35%	K_2O		
		Манган, 0.35%	Mn		
		Цайр, 0.35%	Zn		
		Бор, 0.1%	B		
		Молибден, 0.02%	Mo		
		Celatom 100 % хүртэл			
34	N-ENERGY-X6	Органик нэгдэл, 15%	Органик нэгдэл	6.0	Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
		Нийт азот, 18.5%	N		
		Фосфор, 4%	P_2O_5		

		Кали, 2%	K ₂ O		
		Кальци, 0.2%	Ca		
		Магни, 0.1%	Mg		
		Зэс, 0.01%	Cu		
		Төмөр, 0.01%	Fe		
		Манган, 0.01%	Mn		
		Цайр, 0.03%	Zn		
		Бор, 0.3%	B		
		Молибден, 0.03%	Mo		
		Ус, 100% эзлэхүүн хүртэл	H ₂ O		
35	K-ENERGY-X6	Органик нэгдэл, 15%	Органик нэгдэл	6.0	Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
		Нийт азот, 9.5%	N		
		Фосфор, 5%	P ₂ O ₅		
		Кали, 11%	K ₂ O		
		Кальци, 0.6%	Ca		
		Магни, 0.2%	Mg		
		Зэс, 0.01%	Cu		
		Төмөр, 0.02%	Fe		
		Манган, 0.01%	Mn		
		Цайр, 0.03%	Zn		
		Бор, 0.3%	B		
		Молибден, 0.02%	Mo		
		Ус, 100% эзлэхүүн хүртэл	H ₂ O		
36	Мульти Н	Нийт азот 40%, Үүнээс: Нитрат 11%, Аммон 11%, Шүвтэрийн шүү 18%	NO ₃ NH ₄ NH ₄ NO ₃	10.0	Бүх төрлийн таримлын ургацыг нэмэгдгглэх зориулалт бүхий азотын агууламж өндөртэй холимог бордоо. 1 га-д 1.5-3л тунгаар 100-120 л шүрших шингэн орохоор тооцон ургалтын хугацаанд 2-4 удаа зааврын дагуу хэрэглэнэ.
37	Амко KTS	Калийн исэл 36 %, Хүхэр 25 %	K ₂ O S	5.0	Таримлын өсөлт, хөгжлийг дэмжиж, чанартай ургац авах нөхцлийг бий болгоход 1 га-д 1.5-2.5л тунгаар 100-120 л шүрших шингэн орохоор тооцон ургалтын

					хугацаанд 2-4 удаа зааврын дагуу хэрэглэнэ.
38	Амко –Үр тариа	Нитрат азот-13%, Магнийн исэл-5%, Манган-2%, Зэс-2%	MgO, Mn, Cu	10.0	Усанд хурдан задарч үр тарианы таримлын иш, навчинд шингэж, улмаар навч үүсэх, цэцэглэх үе шатанд онцгой ач холбогдолтой нийлмэл бордоо. 1 га-д 1.5-2.5 кг тунгаар 200 л ажлын шингэн орохоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
39	Амко-Төмс	Нийт азот-14%, Үүнээс: /Нитрат-4.0%, Аммони- 5.0%, Шүвтэрийн шүү- 5.0%, Фосфорын исэл - 25%, калийн исэл -13%, хүхрийн исэл-12.5%	NO ₃ NH ₄ NH ₄ NO ₃ P ₂ O ₅ , K ₂ O, SO ₃	5.0	Төмсний арвин ургац өгөх боломжийг хангадаг микроэлемент агуулсан өндөр үзүүлэлттэй нийлмэл бордоо. 1 га-д 10-12 кг тунгаар 200 л ажлын шингэн орохоор зааврын дагуу хэрэглэнэ.
40	SILICA POWER	Цахиурын хүчил, цахиур 3%	H ₄ SiO ₄	0.1	Хүлэмжийн ургамалд 0,1%-ийн уусмалаар 7 хоног тутам шүршилт хийж бордоход зааврын дагуу хэрэглэнэ.
41	Чёрный Жемчуг	Органик бодисууд, % Цахиурын исэл 7,48-12,98 % Төмрийн исэл 4,36-5,23 % Кальцийн исэл 3,65-4,45 % Магнийн исэл 1,29-2,12 % Калийн исэл 2,85-3,50 % Натрийн исэл 0,23-0,59 % Фосфорын исэл 0,06-0,12 % Хүхрийн исэл 0,14-0,30% Нийт азот 0,35-0,77% Усанд уусдаг марганец 0,00 2-0,007% Усанд уусдаг бор 0,30-0,50 % Нүүрстөрөгч 0,75-1,35% Усны жингийн хувь, %,	70-аас багагүй SiO ₂ Fe ₂ O ₃ CaO ₃ MgO K ₂ O Na ₂ O P ₂ O ₅ (SO ₂) N Mn B C 7-10-иас ихгүй	3.0	Ургац хураасны дараа, ургамлын үлдэгдэл дээр сүрэл дэхь ферментийн задралыг сайжруулах, тарих үед үндэс орчмын хөрсний pH-ыг тэнцвэртэй байлгах, хөрсний бүтцийг сайжруулах, ургамлын ган, давсжилт тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, азотын бордоо хэрэглэсний дараа азотын бордооны үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх, үндэсний дамжуулах судлын чадамжийг дээшлүүлэх, хөрсний шим тэжээлийн элементүүдийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 25-50 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
42	Диаммофоска	Азот -10%; K ₂ O -26%; P ₂ O ₅ - 26%- ээс багагүй	N; K ₂ O; P ₂ O ₅	20.0	Бүх таримал ургамалд бордоо болгон зааврын дагуу хэрэглэнэ.

43	Аммоний нитрат (Ammonium Nitrate 17%)	Аммоний нитрат 17%	$(\text{NH}_4)(\text{NO}_3)$	0.5	Бүх таримал ургамалд бордоо болгон усалгааны ус, хөрсний шинжилгээний дүн, төлөвлөсөн ургацын хэмжээг үндэслэн зааврын дагуу хэрэглэнэ.
44	Сульфат манган (Manganese Sulphate 32%)	Сульфат манган 32%	MnSO_4	0.5	Бүх таримал ургамалд бордоо болгон усалгааны ус, хөрсний шинжилгээний дүн, төлөвлөсөн ургацын хэмжээг үндэслэн зааврын дагуу хэрэглэнэ.
45	Зэсийн сульфат (Copper Sulphate 25%)	Зэсийн сульфат 25%	$\text{CuSO}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$	0.5	Бүх таримал ургамалд бордоо болгон усалгааны ус, хөрсний шинжилгээний дүн, төлөвлөсөн ургацын хэмжээг үндэслэн зааврын дагуу хэрэглэнэ.
46	Цайрын сульфат (Zinc Sulphate-24%)	Цайрын сульфат 24%	$\text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$	0.5	Бүх таримал ургамалд бордоо болгон усалгааны ус, хөрсний шинжилгээний дүн, төлөвлөсөн ургацын хэмжээг үндэслэн зааврын дагуу хэрэглэнэ.
47	Amcolon 20-20-20 + TE	Азот-N-20%, Фосфор-P2O5-20%, Кали-K2O-20%	$\text{N}_2\text{O}_2, \text{P}_2\text{O}_5, \text{K}_2\text{O}$	0.5	Жимсний мод, цитрус, усан үзэм, чидун, лийр, ястай жимс, Хүнсний ногоо (Хүлэмж), Цэцэгт ургамал, Цэцэрлэгжилт 12-14 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
48	Amcopaste 20-20-20 + TE	Азот-N-20%, Фосфор-P2O5-20%, Кали-K2O-20%	$\text{N}_2\text{O}_2, \text{P}_2\text{O}_5, \text{K}_2\text{O}$	0.5	Жимсний мод, цитрус, усан үзэм, чидун, лийр, ястай жимс, Хүнсний ногоо (Хүлэмж), Цэцэгт ургамал, Цэцэрлэгжилт 12-14 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
49	Gold Fert 20-20-20 + TE	Азот-N-20%, Фосфор-P2O5-20%, Кали-K2O-20%	$\text{N}_2\text{O}_2, \text{P}_2\text{O}_5, \text{K}_2\text{O}$	0.5	Хүнсний ногоо: Ил талбай болон Хүлэмж, Тэжээл, Жимсний мод, Чимэглэлийн ургамал 0.8-1.0 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
50	Amcocorn	Азот –N- 13%, Манган – Mn- 5%, Цайр - Zn - 5%	$\text{N}_2\text{O}_2, \text{Mn}, \text{Zn}$	0.5	Эрдэнэшишийн талбайд 0.8-1.0 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.
51	Челе-К хелатжуулагч бэлдмэл	ДТПА (диэтилен-триамин-пента цууны хүчил) (Pentetic acid)	$\text{C}_{14}\text{H}_{23}\text{N}_3\text{O}_{10}$	0.5	Хөрсний давсжилтийг арилгах, хөрсөнд хуримтлагдсан шим тэжээлийн бодисыг ургамалд шингэцтэй хөдөлгөөнт хэлбэрт оруулах зорилгоор 2л/т усанд уусгаж, хөрсийг усална.

52	Microfood	Цайр 2.86%	Zn	1.0	Үр тариа, хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний үржил шимийг дээшлүүлж, Ургач нэмэгдүүлнэ.
		Төмөр 3.82%	Fe		
		Манган 2.00%	Mn		
		Зэс 0.10%	Cu		
		Молибден 0.05%	Mo		
		Магни 1.0%	Mg		
		Бор 0.5%	B		
53	Агроминерал үр тариа (зерновые)	Азот Магнийн исэл Хүхэрийн хүчил, Зэс Төмөр Манган	N MgO SO ₃ Cu Fe Mn	0,5	Үр тарианы 2-3 навчтайгаас бутлалтын төгсгөл хүртэлх үед нэмэлтээр 1.0-1.5л/га бордоно. Ажлын уусмал 150-300л/га
54	Агроминерал тосны таримал (Олейстые)	Азот Магнийн исэл Хүхэрийн хүчил Бор Зэс Төмөр Цайр Манган Молибден	N MgO SO ₃ B Cu Fe Mn Zn Mo	0,5	Рапс, гичийн мөчирлөх үе ба нахиалах үе шатанд 2,0-3,0 л/га тунгаар хэрэглэнэ. Ажлын уусмал 150-300 л/га
55	Агроминерал буурцагтан (стручковые и бобовые)	Азот Магнийн исэл Хүхэрийн хүчил Бор Зэс Төмөр Цайр Манган Молибден Кобальт	N MgO SO ₃ B Cu Fe Mn Zn Mo Co	0,5	Буурцагт ургамлууд 6-7 навчтай үед, давтан шүршилтийг 15-20 хоногийн зайтай 1-2 удаа 2,0 л/га тунгаар, ажлын уусмал 150-300 л/га
56	ЖКУ NP 11:37	N-11%, P ₂ O ₅ -37%	N, P ₂ O ₅	0,5	Бүх тарималд үндсэн болон нэмэлтээр 30-70л/га тунгаар бордоно.
57	Моноаммоний фосфат NP 12:61	N-12% P ₂ O ₅ -61%	N P ₂ O ₅	0,5	Бүх тарималд үндсэн болон нэмэлтээр бордоно.

58	Аммони сульфат NP 20,5:22	N-20.5%, S-22%, MgO-0.4-0.6%	N, S, MgO	0,5	Бүх тарималд үндсэн бордоогоор тарих үед хэрэглэнэ
59	Азот + 5	Азот, N 7.0-8.0 % Магни, Mg 0.8-1.2% Хүхэр, S 2.5-3.0% Зэс, Cu 0.4% Төмөр, Fe (II) 0.4% Манган, Mn 0.5%	N Mg S Cu Fe(II) Mn	0,5	Үр тарианы тарималд 2-3 навчтай болох үеэс гол хатгах үе хүртэл хугацаанд бордооноос 1-2 литрийг 150-200 дахин шингэлж, зориулалтын төхөөрөмжөөр 2-3 удаа цацаж хүртээнэ.
60	Азобор + 8	Азот 14.1-14.5% Магни 0.8-1.2% Хүхэр 2.5-3.0% Бор 0.4-0.5% Зэс 0.2% Төмөр 0.3% Манган 0.3% Цайр 0.2% Молибден 0.003%	N Mg S B Cu Fe Mn Zn Mo	0,5	Рапс, гичийн мөчирлөх үе ба нахиалах үе шатанд 2,0-3,0 л/га, наранцэцгийн 3-4 хос навч үүсэх үед 2-3 долоо хоногийн зайтай 2,0-3,0 л/га тунгаар, ажлын уусмал 150-300 л/га тунгаар хэрэглэнэ.
ГИДРОПОНИКИЙН НИЙЛМЭЛ БОРДОО					
61	Азобор + 8	Моноammonium phosphate , MAP /моноаммоны фосфат / Potassium nitrate /калийн нитрат/ Urea /мочевин/ Magnesium sulfate /магнийн сульфат/	NH ₆ PO ₄ KNO ₃ CH ₄ N ₂ O MgSO ₄	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тарималд шим тэжээл болно.
62	Calma star	Ammonium dihydrogenphosphate /Аммонийн дигидроген фосфат/ Potassium nitrate /калийн нитрат/ Calcium lignosulfonate , CLS	NH ₄ H ₂ PO ₄ KNO ₃ C ₂₀ H ₂₄ Ca O ₁₀ S ₂	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тарималд шим тэжээл болно.
63	CaB-Gro	Calcium formate /кальцийн формат / Citric acid / нимбэгний хүчил/	C ₂ H ₂ O ₄ Ca C ₆ H ₈ O ₇	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тарималд шим тэжээл болно.
64	Zyme fruit star	Potassium humate / Калийн гумат/	C ₉ H ₈ K ₂ O ₄	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх,

		Monoammonium phosphate, MAP /моноаммоны фосфат/	NH_4PO_4		ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тарималд шим тэжээл болно.
65	Zume Fulvic Star	Fulvic acid / Фүлвик хүчил /	$\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_8$	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тарималд шим тэжээл болно.
		Monoammonium phosphate, MAP /моноаммоны фосфат /	NH_4PO_4		
		Potassium nitrate /калийн нитрат/	KNO_3		
66	Zyme Root star	Potassium humate / Калийн гумат/	$\text{C}_9\text{H}_8\text{K}_2\text{O}_4$	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тариа бүр тарималд шим тэжээл болно.
		Monoammonium phosphate, MAP /моноаммоны фосфат /	NH_4PO_4		
		Calcium lignosulfonate , CLS	$\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{Ca O}_{10}\text{S}_2$		
67	Friut ok	Азот 3.33%	N	0.5	Хүнсний ногоо, зүлэг модыг бордох, хөрсний, үржил шимийг хадгалах, нэмэгдүүлэх, ургац нэмэгдүүлэх, гидропоникийн нөхцөлд тарималд шим тэжээл болно.
		Калийн исэл 21.6%	K_2O		
		Магни исэл 0.032%	MgO		
		Цайр 0.13%	Zn		
		Төмөр 0.25%	Fe		
		Цальцийн исэл 0.53%	CaO		
		Борийн исэл 0.47%	B_2O_3		
		Натри 0.49%	Na		
		Хлор 0.43%	Cl		
		Органик бодис 0.30%	Органик бодис		
68	ХЭФК	Этефон, 480 г/л	$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_3\text{C}_1\text{P}$	1.0	Үр тариа болон бусад таримлын ургалтыг зохицуулах бөгөөд буудай, лооль, бөөрөнхий сонгинод 0.5-4.5л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ
62	Рэгги	Хлормекватхлорид, 750 г/л	$\text{C}_5\text{H}_{13}\text{Cl}_2\text{N}$	1.0	Үр тариа, буурцагт ургамал, эрдэншиг, төмс 0.1-0.5л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ.

----- оо0оо -----